

변비는 불규칙한 식사습관, 운동부족, 스트레스 등으로 인해 발생되기 쉬우며 특히 체중감량을 위해 식사량을 줄이는 여성에게서 많이 발생합니다. 일반적으로 변비로 인해 나타나는 증상은 식욕부진, 복부팽만, 두통, 신경과민 등이 있으며 피부가 거칠어지거나 기미, 여드름 등이 생기기도 합니다.

메이퀸 S정은 생약 및 양약성분 4종으로 복합처방되어 있으며 이들 약물의 상호 협동·보완 작용으로 인해 변비를 개선시키며 비교적 부작용이 적은 제제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정량

카산트라놀 (U.S.P.).....	14mg
(카스카로시드류<카스카로시드 A로 환산된>로서 22mg)	
도큐세이트 나트륨 (U.S.P.).....	20mg
데히드로콜린산 (약전).....	50mg
비사코딜 (약전).....	4mg
첨가제(타르색소) : 황색4호 알루미늄레이크, 청색1호 알루미늄레이크, 황색5호 알루미늄레이크	

【성상】 녹색의 타원형 필름코팅정

【약리작용 및 특징】

1. 생약 및 양약성분에 의한 대장 운동기능 강화

메이퀸 S정의 카산트라놀(생약)과 비사코딜(양약)은 장관내의 기능조절부위인 Auerbach's plexus(아우에르바흐 신경총)에 작용하여 약화된 대장의 기능을 강화시켜줍니다.

2. 효과적인 배변유도

메이퀸 S정의 도큐세이트 나트륨은 단단하게 굳어 있는 장내용물에 수분이 잘 흡수되도록 하므로써 효과적인 배변이 이루어지도록 해주며 데히드로콜린산은 완하효과와 함께 지방의 소화흡수를 도와줍니다.

3. 부드럽고 상쾌한 변비치료제

메이퀸 S정은 생약 및 양약성분 4종으로 구성된 복합처방 제제로서 부드럽고 상쾌한 배변을 유도합니다.

【효능·효과】

- 변비
- 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

【용법·용량】

- 성인(15세 이상) : 1일 1회, 1회 1~3정을 취침전에 복용합니다.
 - 소아(11~14세) : 1일 1회, 1회 1~2정을 취침전에 복용합니다.
- 다만, 초회는 최소량을 복용하고, 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 사람은 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

- 1) 심한 복통 또는 구역, 구도가 있는 사람
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
- 3) 다른 약물을 투여받고 있는 사람

2. 복용할 때 다음 사항에 주의하십시오.

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 소아에 복용시킬 때에는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오.
- 3) 이 약은 7세 이하의 유·유아에게 복용시키지 마십시오.

3. 복용중 또는 복용후는 다음 사항에 주의하십시오.

- 1) 이 약을 복용함으로써 심한 복통, 설사, 구토 등이 나타난 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 의사와 상의하십시오.
- 2) 자극성 완하제는 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안됩니다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사하여야 합니다.

4. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 (습기가 적은) 서늘한 곳에(밀전하) 보관하십시오.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

5. 적용상의 주의

이 약은 황색 4호 (타르트라진)를 함유하고 있으므로 약물에 과민하거나 알러지 경력이 있는 사람은 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

【저장방법】

밀폐용기, 실온보관

【포장단위】

10, 100, 500정

【제품문의처】 소비자 상담실 : 080-587-7575(주선자 요금부담)

※ 유통과정 중 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 약국개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

설명서개정년월 : 2008.06

http:// www.myunginph.co.kr

MST 0608-12



※ 본 의약품을 사용하기 전에 설명서를 주의깊게 읽고, 본 의약품과 함께 보관하십시오.