

※ 첨부문서는 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 첨부문서를 보관하십시오.

생약성분이 함유된 종합감기약

두리콜[®] 캡슐

Duricol Caps.

일반의약품

분류번호 : 114



감기는 일반적으로 상부 호흡 기도에 발생하는 급성 바이러스성 감염질환으로서 재채기, 콧물, 코막힘, 오한, 피로감, 두통, 인후통 등이 주증상으로 나타나며 이차적으로 다른 합병증(예 : 기관지염, 폐렴, 편도염, 축농증, 중이염 등)으로 진전되기도 합니다.

두리콜캡슐은 감초, 길경과 같은 생약과 함께 비타민, 감기의 복합적인 제증상 개선을 위한 각종 의약성분이 함유되어 일반적인 비염증상 및 두통 등을 동반하는 감기의 전반적인 증상에 대해 효과가 우수합니다.

또한 약제 복용시 우려되는 위장장해를 방지하기 위해 위점막 보호제인 메타규산알루미늄산마그네슘이 함께 처방되어 있습니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

아세트아미노펜(약전)	150.0mg
브롬화수소산덱스트로메토르판(약전).....	7.5mg
dl-염산에칠에페드린(약전)	6.25mg
말레인산클로르페니라민(약전)	1.25mg
무수카페인(약전)	20.0mg
감초엑스산(5→1)(별규)	21.0mg
(글리실리진으로	2.1mg)
길경엑스산(10→1)(별규)	9.0mg
메타규산알루미늄산마그네슘(식약청고시 2000-14호)	80.0mg
(건조물로서	70.4mg)
질산치아민 (약전)	4.0mg

【성상】 갈색의 가루가 들어있는 상하단 백색의 경질캡슐제

【효능·효과】

감기의 제증상 (콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화.

【용법·용량】

성인(15세이상) : 1회 2캡슐, 1일 3회 식후 30분에 복용한다.

8~14세 : 1회 1캡슐, 1일 3회 식후 30분에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 다음 사람은 복용하지 말것.

- 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상 [예를 들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등)]을 일으킨 적이 있는 사람.
- 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람.

3. 다음 사람은 복용전에 의사·약사와 상의할 것.

- 1) 본인, 양친 또는 형제등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람.
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람.
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영·유아 및 14세 이하의 어린이.
- 4) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람.
- 5) 심장 또는 신장에 장애가 있는 사람 또는 고령자.
- 6) 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람.
- 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부.
- 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.
- 9)혈압이 높은 환자 또는 고령자

10) 부종이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본제의 복용에 의해 뇨량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것.
- 2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것.
- 3) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.

5. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것.

- 1) 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것.
진해거담약, 다른감기약, 해열진통약, 항히스타민제, 진정제 등
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시킬 것.
- 4) 3개월 미만의 유아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 유아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용 시키지 않는 것이 좋다.

6. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의할 것.

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
- 3) 여러차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 4) 장기 연용하지 말 것.
- 5) 장기간 사용시 위장관에 대한 부작용, 특히 출혈궤양 및 천공이 일어날 수 있다.
- 6) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것.
 - ① 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우.
 - ② 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
 - ③ 천식이 나타난 경우
- 7) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.
- 8) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.

7. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 2) 직사일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포 장 단 위】 6, 10, 100, 300, 600캡슐

【저 장 방 법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한(유효기한)이 경과되었거나 변질, 변패, 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

문서작성년월일 : 1994. 12. 01

문서개정년월일 : 2004. 07. 23

제조발매원



초당약품공업주식회사

본사 : 서울특별시 구로구 구로5동 44

전화 : 869 - 0181~5

공장 : 경기도 안산시 단원구 목내동 487번지

소비자상담전화 : 080-258-2323

※이 첨부문서 작성일자이후 변경된 내용은 (www.chodang.com)나 (전화 : 02-869-0181)에서 확인 할 수 있음.