

[이 약을 사용하기 전에 첨부된 문서를 주의깊게 읽으시기 바랍니다.
읽으신 후 버리지 마시고, 이 약과 함께 보관하시기 바랍니다.]

전문의약품

각막보호 및 치료제

분류번호 : 131

솔코린® 점안겔

SOLCORIN Eye gel.

솔코세릴 120농축물 (Solcoseryl 120 concentrate)

Solcoseryl은 스위스 Solco사에서 개발된 단백질 제거 송아지혈액추출물로서 다양한 원인으로 인해 상처 입은 세포의 산소이용률을 개선하고 필수대사물질의 흡수를 촉진함으로써 조직의 재생을 도와줍니다.

솔코린®점안겔은 이러한 Solcoseryl을 주성분으로 하는 점안용 겔제제로 탁월한 흡윤력을 바탕으로 한 번 점안 후 장시간동안 상처부위에 부착상태를 유지토록하여 약효성분의 지속적 흡수를 도와 효과적으로 안구의 상처를 치료하는 작용을 합니다.

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

솔코세릴 120농축물(Solcoseryl 120 concentrate (별규)
..... 70.05mg(건조물로서 8.3mg)

첨가제 (보존제) : 벤잘코늄염화물 (Benzalkonium Chloride)(약진)..... 0.1mg

첨가제 : 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, D-소르비톨액 (70%), 에데트산나트륨수화물, 수산화나트륨, 락트산, 주사용수

[성상] 무색 또는 옅은 황색의 투명하고 균질한 겔

[약리작용 · 특징]

1. 탁월한 조직재생 효과

솔코린®점안겔은 상처부위에서의 산소이용을 개선하고 필수대사물질(Essential metabolite)의 흡수를 촉진함으로써 고에너지 필요로 하는 조직수복과정을 빠르게 합니다.

솔코린®점안겔 적용 후의 재생조직은 장력 및 콜라겐 함량이 있어서 정상조직과 거의 유사할 정도로 그 질이 우수합니다.

2. 우수한 부착성

솔코린®점안겔은 각막에 장시간 동안 잘 부착되어 균일하게 분포하므로 활성물질이 병변 · 손상조직으로 지속적이고 일정하게 작용하도록 도와줍니다.

3. 적용의 편리성

솔코린®점안겔은 결막낭(결막주머니)에 직접 떨어뜨려 사용하므로 적용이 편리하며, 투명하게 되어있어서 환자의 시야를 방해하지 않습니다.

4. 탁월한 내약성(약에 대한 내성)

솔코린®점안겔은 항원성이 없고 무독성이므로 누구에게나 안심하고 사용할 수 있습니다.

[효능 · 효과]

각막개양, 각막손상, 산 또는 알칼리에 의한 각막부식, 각막의 퇴행성 병변, 대수포성 각막염.

[용법 · 용량]

1회 1방울 1일 3~4회 결막낭(결막주머니)에 점안(눈에 넣음)하십시오. 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

사용방법

처음 점안(눈에 넣음) 할 때 하부의 링이 분리될 때까지 두꺼운 세게 돌려서 여십시오. 개봉 후 하부 링은 불필요하므로 버리십시오.

하부 링은 불필요
하므로 버리십시오.



【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

이 약 또는 소의 혈액을 원료로 하는 제제에 대하여 과민증의 병력이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여 하십시오.

- 1) 지금까지 안약에 의한 알레르기 증상(눈의 충혈, 가려움, 부종(부기), 발진, 발적(충혈되어 붉어짐))등을 일으킨 일이 있는 환자
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 부작용

- 1) 이 약 투여로 과민증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하십시오.
- 2) 이 약 투여로 일시적인 작열감(화끈감)이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

치료중에는 콘택트렌즈의 착용을 피하십시오.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 및 수유부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다.

6. 적용상의 주의

- 1) 점안용으로만 사용하십시오.
- 2) 점안시 용기의 입구가 직접 눈에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 3) 오염을 방지하기 위해 뭍 수 있는 한 공동으로 사용하지 마십시오.
- 4) 개봉 후 1개월 이내에 사용하십시오.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】

차광밀봉용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】

5g

【소비자 상담 창구】

제품문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 전화 및 이메일을 주십시오.

TEL : (02) 3489-6114

홈페이지 : <http://www.hanlim.com>

【반품 및 교환】

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회가 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

본 설명서 개정년월일 (2013. 01. 28)이후의 변경된 내용은 당사 홈페이지나 상담전화를 통하여 확인하실 수 있습니다.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.

설명서 작성년월일 : '94. 10. 05

설명서 개정년월일 : '13. 01. 28

제품의 사용기한은 외보용기에 표기

P32141-22

제조·판매원
 **한림제약 주식회사**
공장: 경기도 용인시 처인구 명문로 2-27(유방동)
<http://www.hanlim.com>