

간염치료제 레오빌[®]정 (비페닐디메틸디카르복실레이트)

레오빌정은 오미자열매에서 추출된 Biphenyl Dimethyl Dicarboxylate(BDD)를 주성분으로 하는 간염 치료제로서 간장세포 면역증진작용, 간장세포막의 안정화작용, SGPT의 하강작용, 독성물질로 인해 손상된 간장의 회복, 보호작용, 간마이크로솜 cytochrome p-450 유도작용 등이 입증되었으며 또한 간염 바이러스의 활동 및 증식을 억제하고 각종 생화학 수치의 동시조절과 손상된 간장조직의 재생, 보호 효과, 간장세포의 항돌연변이 작용 등을 갖고 있습니다.

[성분·함량] (1정 중)

비페닐디메틸디카르복실레이트(Biphenyl Dimethyl Dicarboxylate)(별규)

25mg

[성상]

흰색의 장방형 정제

[약리작용 및 특징]

1. 간세포 파괴 억제 및 재생 보호

간염 바이러스, 독성물, 약물 등의 각종 유해인자들이 간세포내에 축적되는 것과 간대사와 간세포에 치명적인 과산화지질, 유리산소를 생성하는 등, 간세포가 파괴되는 것을 방지하고 간세포내 중요 효소, 즉 단백질 효소, 핵도 효소 등을 증대시켜 간세포를 재생시키고 보호합니다.

2. 간장질환의 척도가 되는 SGPT, SGOT 수치 정상화

정상시에는 소량이던 SGPT, SGOT 두 효소는 간장질환시에는 혈중으로 유출되어 그 농도가 급격히 높아 지는데, BDD는 이들 수치뿐만 아니라 간염의 병리증상을 나타내는 기타 혈청 빌리루빈, 알부민, 감마 글로불린 등을 동시에 조절하여 이들 정상화시키는 효능이 있습니다.

3. 복용에 따른 부담이 적은 제제

BDD 성분을 주성분으로 하는 레오빌정은 부작용이 경미하고 오히려 약물에 의한 부작용을 억제시키는 효능을 갖고 있으므로 장기 치료를 요하는 환자들이 복용하기가 좋습니다.

[효능·효과]

지속적으로 ALT가 상승되어 있는 만성간염 및 약물로 인해 트랜스아미나제(Transaminase)가 상승된 간염.

[용법·용량]

성인 : 비페닐디메틸디카르복실레이트로서 1회 25~50mg, 1일 3회 경구 투여하십시오.

증상에 따라 적절히 증감하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오..

- 1) 만성 활동성 간염 환자
- 2) 간경변 환자

2. 이상반응

- 1) 입안마름, 메스꺼움, 피부발진이 일어날 수 있으며, 이러한 이상반응은 항과민약을 병용투여하면 소실됩니다.
- 2) 일과성 황달이 나타날 경우도 있으나 투약을 중지하거나 황달 치료제를 병용 투여하면 소실됩니다.
- 3) 드물게 구역과 복부팽만이 발생할 수도 있으나 곧 소실됩니다.

3. 상호작용

이노신(inosine)과 함께 투여시, 재발한 ALT의 상승이 개선될 수 있습니다.

4. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 및 수유부에는 투여하지 않습니다.

5. 소아에 대한 투여

소아에는 용량을 감소시켜 투여하십시오.

6. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 신중히 투여하십시오.

7. 임상검사치에의 영향

치료 중에 다시 ALT가 상승하는 환자는 거의 없습니다. 투여 중지 후에 ALT는 증가할 수 있으나 이 약의 재투여로 개선됩니다.

8. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

[저장방법 및 사용기간] 차광기밀용기, 3년

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시 "소비자 피해보상 규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com