

크라겔정

위염 · 위통 · 위산과다(制酸劑)

일반 의약품
분류번호: 234
KGMP 적격업체

※의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

● 원료약품의 분량 : 1 정중

건조수산화알루미늄겔 (KP)	200mg
탄산마그네슘 (KP)	50mg
침강탄산칼슘 (KP)	100mg
탄산수소나트륨 (KP)	50mg

● 성 상 : 백색의 원형정제

● 효능 · 효과 : 위산과다 (위염, 위 · 십이지장궤양에 관련된 것도 포함), 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림

● 용법 · 용량 : 성인 1회 2정 1일 4회 식간(식사때와 식사때 사이에) 및 취침시 복용한다.

● 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

투석요법을 받고 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

다른 약물을 투여 받고 있는 환자

3. 부작용 (이상반응)

이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.

2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의한다.

3) 장기연용(계속사용)을 하지 않는다.

4) 신장(콩팥)병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다.

5. 소아에 대한 투여

이 약은 7세 이하의 영(젖먹이) · 유아에게 투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.

3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

● 포장단위 : 10정, 100정, 1000정

● 저장방법 및 사용기한 : 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 3년

개정년월일 : 2003년 05월 21일

※본 의약품은 엄격한 품질관리(KGMP)를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마시기 바랍니다.

※최신의 정보 확인 방법 : 변경된 내용은 학술부 (031-443-3922~3)에서 확인할 수 있음.

※이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 의약품 정보를 참조하십시오.



크라운제약(주)

경기도 안양시 만안구 안양7동 218-7

서울: (02)754-4271 안양(학술부): (031)443-3922-3

제조발매원