

1정 오렌지향 배합

일반의약품

분류번호 642

1회 1정 광범위 구충제

유니콤 정

(알벤다졸)

제조사
UNIMED
유니메드제약

■ 원료약품 및 그 분량 : 1정 중

알벤다졸(U.S.P.)..... 400mg

■ 성상 : 오렌지색 장방형 필름코팅정

■ 효능·효과 : 회충, 요충, 십이지장충, 편충, 아메리카 구충, 분선충의 감염 및 이들 혼합감염의 치료

■ 용법·용량 : 1. 성인 및 2세 이상의 유·소아 - 1) 회충, 요충, 십이지장충, 편충, 아메리카 구충 : 400mg을 1회 복용한다. 2세 이상의 유·소아의 요충증은, 200mg을 1회 복용하고 7일 후 200mg을 반복 복용할 수 있다. 2) 분선충 : 1일 1회 400mg을 3일간 복용한다. 3) 편충의 중증 혼합 감염시 : 1일 1회 400mg을 3일간 복용한다.

※섭취한 소량의 물로 복용할 수 있으며 식사를 중단하거나 하제를 쓰는 등의 특별한 과정은 필요 없다.

※치료 3주 후 검사를 하여 치료되지 않았으면 경우에 따라 2차 복용을 실시할 수 있다.

■ 사용상의 주의사항 : 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. -1) 이 약 및 이 약 구성 성분에 과민반응 환자 2) 임부 3) 2세 미만의 영아 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. -테오필린 : 테오필린의 대사를 억제할 수 있다. 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기전에 의사 및 약사와 상의할 것. -이 약이 모유로 이행되는지에 관해서는 알려진 바 없으나, 이 약 복용시에는 수유를 중단하는 것이 좋다. 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것. -1) 피부점막만증후군(스티븐스-존슨증후군), 다형홍반이 나타날 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 실시한다. 2) 구역, 구토, 속쓰림, 설사, 상복부 또는 복부 통증 등의 위장관 장애 또는 두통 및 어지러움이 나타날 수 있다. 3) 드물게 발열, 발진, 전신 발적, 가려움, 두드러기 등이 나타났다는 보고가 있다. 4) 가역적인 탈모증이 나타날 수 있다. 5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 -1) 이 약 사용 전에는 반드시 임신 중이 아님을 확인한 후에 사용할 것. 임신초기 동안에 이 약의 투여를 피하기 위해서 가임연령의 여성은 생리 첫 주 동안 또는 임신 테스트에서 음성인 나타난 후에 치료를 시작할 것 2) 임상검사치에의 영향 : 때때로 가역적인 백혈구 수의 감소를 유발할 수 있고, 과도한 처방시 변혈구 감소증 및 간효소치 이상을 유발할 수 있다. 3) 프라지관텔이 알벤다졸 활성대사체의 혈장농도를 증가시킨다는 보고가 있다. 4) 과량투여 했을 경우 대증요법(위세척) 및 일반적인 지지요법을 사용한다. 6. 저장상의 주의사항 -1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선의 피하여 건냉한 곳에 실온보관할 것. 3) 오염을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 본 제품의 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손되었을 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

• 서울시 송파구 잠실본동 250-8 유니메드빌딩 / (02)2240-5100

• 공장 : 충남 아산시 신평동 251번지 / 홈페이지 : www.unimed.co.kr
UM020507

