

생약성분이 함유된 진해거담제

제담[®]시럽

일반의약품

무색소(Dye-Free)

분류번호

222 (진해거담제)

제담시럽은 기침, 천식, 가래를 효과적으로 가라앉혀 주는 생약성분이 함유된 우수한 진해거담제로서 기관지 확장제인 트리메토클놀염산염수화물, 항히스타민제인 클로르페니라민말레산염을 비롯하여 점액 분해 및 배출을 용이하게(쉽게) 하는 리소짐염산염과 세네가유동엑스가 배합되어 있어 기침, 천식, 가래에 우수한 효과를 나타냅니다.

〈쉬운 용어 진해 : 기침을 그치게 함 / 거담제 : 가래약〉

원료약품의 분량(100mL 중)

트리메토클놀염산염수화물(KP).....	10.0mg	클로르페니라민말레산염(KP).....	20.0mg
리소짐염산염(KP).....	100.0mg	세네가유동엑스(별규).....	1.67mL
첨가제(보존제):파라옥시벤조산메틸(KP) 70.0mg		첨가제(보존제):파라옥시벤조산프로필(KP) 30.0mg	

성상 : 이 약은 갈색 유리병에 든 옅은 갈색의 시럽제입니다.

약리작용

1. 트리메토클놀염산염수화물은 기관지 β_2 - 수용체에 선택적으로 작용하여 기관지 확장작용을 나타냅니다.
2. 항히스타민 성분인 클로르페니라민말레산염이 함유되어 있어 감기의 특징적인 증상인 재채기, 콧물, 코막힘 등의 증상을 신속히 억제시킵니다.
3. 리소짐염산염은 비점막의 섬모운동을 촉진하여 점액의 분해, 배출을 용이하게(쉽게) 하며 점액의 점도를 낮춰줍니다.
4. 세네가유동엑스는 설인신경 지배하의 점막을 자극하여 반사적인 기도분비를 촉진시키고 분비 점액의 배출을 항진시켜 거담작용을 나타냅니다.

효능·효과 : 기침, 천식, 가래

용법·용량

다음의 1회량을 1일 4회, 최대 6회까지 식후 및 취침시에 복용합니다. 복용간격은 4시간 이상으로 합니다.

연령	1회량
만2세 미만 : 만2세 미만에게 투여하지 않습니다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받습니다.	
만2세 이상~만5세 미만	2mL
만5세 이상~만8세 미만	3mL

연령	1회량
만8세 이상~만11세 미만	5mL
만11세 이상~만15세 미만	6mL
성인(만15세 이상)	10mL

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 다음의 주의사항을 잘 읽어 보시고 복용하시기 바랍니다.

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분 또는 달걀에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 3) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 마십시오.

다른 진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약[비염(코염)용 경구제, 말미약, 알레르기용약], 진정제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람

- 3) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨곤란, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 6) 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열 · 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
- 7) 이 약은 카라멜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

4. 소아에 대한 투여

만 2세 미만에게 투여하지 않습니다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받습니다.

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역 · 구토, 식욕부진, 어지러움, 배뇨곤란, 목마름(지속적 이거나 심한), 불안, 떨림, 불면
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
 - ① 속(아나필락시스) : 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다.
 - ② 피부점막안증후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사용해(리엘증후군) : 고열을 동반하고, 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있습니다.
- 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- 2) 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오.
- 3) 복용시에는 음주하지 마십시오.
- 4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피하십시오.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관합니다.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관합니다.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.
- ※ 이 약은 생약성분인 세네가유동엑스가 함유되어 있어 침전이 생길 수 있으니 흔들어서 복용하십시오.

저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 : 90mL

- 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- 이 설명서는 2015년 10월 12일자로 작성되었으며 이 후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

일동 제당시럽은 어린이들이 쉽게 개봉하기 어려운 어린이 보호용 마개(CRC=Child-Resistant Closure)를 사용하여 어린이 약물중독을 예방하고 있습니다.

[사용법]

1. 뚜껑을 누른 상태에서
2. 시계 반대 방향으로 돌려주세요.



제조사 :

(주)녹십자

충북 음성군 금왕읍 무곡로65번길 26

제조의회사 :

일동제약주식회사

본사 : 서울특별시 서초구 바우뎀로27길 2

공장 : 경기도 안성시 공단로 25

소비자상담실 : (전화) 080-022-1010 (수신자부담)