



맛있게 상큼하게 씹어먹는 감각 비타민C
바이탈·씨 엔정

분류번호 314 : 비타민C 및 P제

개요 및 특징

바이탈씨엔정 1정 중에는 피부미용과 피로회복에 효과적인 비타민C가 500mg 함유되어 있으며 항산화비타민인 토코페롤을 함유하여 세포의 노화 방지에 도움을 줍니다.

바이탈씨엔정에는 또한 비타민B₂와 B₆가 함유되어 있어 비타민C와 협력적으로 작용하여 임신·수유기, 병중·병후, 노년기의 비타민C의 보급에 효과가 좋은 영양제입니다.

B₂+B₆+C+E

성분·함량 1정 중


낙산리보플라빈(비타민B₂)(KP) ······ 2mg
염산피리독신 97%과립(비타민B₆)(별규) ······ 10.3mg
(염산피리독신으로서 10mg)
아스코르빈산 97%과립(비타민C)(별규) ······ 515.5mg
(아스코르빈산으로서 500mg)
초산토코페롤 50%(비타민E)(KP) ······ 20mg
(초산토코페롤로서 10mg)
첨가제(타르색소) : 황색 203호

성상 미황색의 씹어먹는 원형정제

앞면	뒷면	측면

효능·효과

- 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
- 잇몸출혈·비출혈 예방
- 다음 경우의 비타민 C, B₂, B₆, E의 보급
 - 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시, 노년기



용법·용량

8세 이상의 어린이 및 성인
: 1회 1정, 1일 2회 입안에서 녹이거나 씹어서 복용합니다.

※ 어린이나 입안이 연약한 분들은 오랫동안 녹여 드시는 것보다 씹어서 복용하시는 것이 좋습니다.

사용상의 주의사항

1.경고

이 약에 함유되어 있는 인공감미제 “아스파탐”은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성 질환인 페닐케톤뇨증 환자는 복용하지 마십시오.

2.다음 환자는 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 3개월 미만의 영아

3.다음 환자는 신중히 복용하십시오. (복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 과수산노증 환자(Hyperoxaluria : 노증에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부, 수유부

4.부작용

- 1) 이 약의 복용에 의하여 구역, 구토, 설사, 식욕부진, 복부팽만감, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
- 2) 이 약의 복용에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 장기간 고용량을 복용할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상 (Neuropathy : 말초 신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있습니다.

5.일반적 주의

- 1) 정해진 용법 용량을 잘 지킵니다.
- 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용시킵니다.
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.


6.상호작용

이 약을 복용할 경우에는 레보도파와 함께 복용하지 않습니다.


7.임상 검사치에 대한 영향

- 1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.


8.저장상의 주의사항



1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.



2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.



3) 잘못된 사용 및 남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

저장방법 건냉소(15°C이하의 건조한 곳)에 보관, 밀폐용기

사용기한 외부포장에 표기

※ 블리스터 포장의 제조번호/사용기한 표시 방법은 아래와 같습니다.
예) 제조번호 #9001, 사용기한 2012. 01. 07인 경우 → “9001/120107”로 표시

포장단위 20정, 120정

※ 이 의약품은 KGMP(우수의약품제조관리기준) 적격업체 의약품으로 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 파손된 제품 일 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 설명서의 최근 변경된 내용은 홈페이지(www.yuhan.co.kr)또는 소비자상담실(080-024-1188)에서 확인하실 수 있습니다.



제조판매원

유한양행

본사 : 서울시 동작구 대방동 49-6

공장 : 충북 청원군 오창읍 양청리 807-1

www.yuhan.co.kr

소비자상담실 080-024-1188(수신자 요금부담)

설명서개정년월일 2009. 1. 13
제품의 사용기한은 외부포장에 표기