

※ 이 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.



일반의약품

HEPA-L Soft Capsule

■원료약품 및 그 분량 : 1캡슐 중

L-시스틴 (BP).....	250mg
콜린타르타르산염 (DAB).....	250mg

■성상

유백색의 내용물을 함유한 상의 갈색, 하의 연갈색의 연질캡슐

■효능·효과

간기능 저하로 인한 소화불량의 보조치료

■용법·용량

성인 - 1일 1~2캡슐을 식전 또는 소화불량시 복용하며 1일 4캡슐을 초과하지 않습니다.

■사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 중증의 간세포기능부전이나 담도(담관) 폐색(닫혀서 막힘) 환자
- 2) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 3) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

시스틴노증 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 문서를 소지하십시오.

소화기계 : 설사와 복통이 나타날 수 있습니다.

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 지키십시오.
- 2) 이 약의 복용으로 이상 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

6. 일반적 주의

지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단 될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정 주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

■저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 연질캡슐은 제형이 특수하므로 보관상태(온도 40℃ 이상, 상대습도 75% 이상)에 따라 젤라틴 피막이 변형될 수 있습니다. 특히 여름철 온도나 습기가 높은 곳을 피하여 보관하십시오.

■ **사용기한** : 외부포장에 표시된 사용기한 내에 사용하십시오.

■ **포장단위** : 100 캡슐

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※문서 작성일(2014년 7월 2일) 이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실(TEL: 080-203-6000) 에서 확인할 수 있습니다.

※의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인 의약품사전 (<http://drugmfrs.go.kr>) '의약품검색' 란을 참조하십시오.

제조외뢰자 · 판매원 : **코오롱제약(주)** 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45

제조자 : **(주)서흥** 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

최초 작성연월일 : 19961007

최종 개정연월일 : 20140702

❖ 코오롱제약주식회사

공장 : 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45