

무좀 치료제 발무졸® 크림

Balmuzol cream 분류번호 : 265(기생성 피부질환용제)

발무졸크림은 무좀 및 백선을 일으키는 원인균(진균)에 대해 강력한 살균작용을 나타내는 미코나졸 질산염과 가려움증을 없애주는 크로타미본, 항염 및 항알레르기 작용이 있는 글리시리진산디칼륨 그리고 국소진통작용이 있는 리도카인이 이상적으로 배합된 무좀 및 백선 전문치료제입니다.

또한, 발무졸크림은 피부침투성이 우수한 크림기제를 사용하여 제조되었으므로 1일 1회 사용으로 충분한 치료효과를 나타냅니다.

【원료약품 및 그 분량】 1g 중

미코나졸질산염(U.S.P.)	10mg
리도카인(K.P.)	20mg
크로타미본(U.S.P.)	100mg
글리시리진산디칼륨(KPC)	5mg
첨가제(보존제): 파라옥시벤조산나트륨(K.P.)	0.5mg
파라옥시벤조산프로필(K.P.)	0.5mg

【성상】 담백색의 크림제

【약리작용 및 특징】

1. 살진균 작용

발무졸크림의 미코나졸질산염은 무좀 및 백선을 일으키는 원인균(진균)의 세포막 투과성을 변화시켜 진균세포를 과사시키므로써 강력한 살진균 작용을 나타냅니다.

2. 진양작용

발무졸크림의 크로타미본은 진양작용을 나타내는 성분으로써 가려움증이 있는 무좀에 매우 효과적으로 사용할 수 있습니다.

3. 항염 및 항알레르기 작용

발무졸크림의 글리시리진산디칼륨은 스테로이드양 작용을 나타내므로써 피부의 알레르기 및 염증 치료에 우수한 효과를 나타냅니다.

4. 국소 진통작용

발무졸크림의 리도카인은 국소진통작용이 있어 통증을 수반하는 무좀치료에 특히 효과적입니다.

5. 우수한 조직침투력

발무졸크림은 약물의 피부내 침투가 양호한 크림기제를 사용하므로써 1일 1회 도포만으로도 충분한 치료효과를 나타냅니다.

【효능·효과】 무좀, 완선(사타구니백선(증)), 체부백선

【용법·용량】

1일 1회 적당량을 환부(질한 부위)에 바릅니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 부위에는 투여하지 마십시오.

- 눈 또는 눈주위, 접막(예를 들면 구강(입안), 비강(코안), 질 등), 음부, 외음부 등
- 습진
- 습윤(습기 참), 미란(젖무름), 균열(갈라짐) 또는 외상(상처)이 심한 환부(질한 부위)

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 옷 등에 의한 피부염 등)을 일으킨 적이 있는 환자
- 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자
- 환부(질한 부위)가 안면(얼굴)이거나 광범위한 환자
- 환부(질한 부위)가 화농(끓음)성인 환자
- ‘습진’과 ‘무좀·완선(사타구니백선(증)), 체부백선’의 구분이 불확실한 환자(음부·가려움, 미란(젖무름) 등의 증상이 있는 경우에는 습진 등 다른 원인에 의한 경우가 많습니다)
- 영아(갓난아기)·유아
- 의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 이상반응

이 약의 사용으로 인해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 옷 등에 의한 피부염, 부종(부기), 자극감, 낙설, 미란(젖무름), 건조·당기는 느낌, 수포 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의합니다.

4. 일반적주의

- 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
- 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용합니다.
- 2주정도 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의합니다.

5. 적용상의 주의

- 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 않습니다.
- 눈에 들어가지 않도록 주의합니다. 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물로 씻고 안과 의사의 진찰을 받습니다.
- 환부(질한 부위) 또는 그 주위가 더러울 경우에는 바로 사용하지 않습니다.
- 이 약이 묻은 손으로 눈이나 점막 등을 만지지 않습니다.

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 적사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관합니다.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.
- 화기에 가까이 하지 않습니다.

【저장방법】 차광, 기밀용기

【포장단위】 15g

【최신정보확인방법】

설명서 개정일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

【제품문의처】 소비자 상담실: 080-587-7575(수신자 요금부담)

※ 유통과정 중 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 약국 개설자 및 의약품판매업자에 한하여 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다.

설명서개정년월 : 2011.06

<http://www.myunginph.co.kr>

BMO 0611-10



※ 본 의약품을 사용하기 전에 설명서를 주의깊게 읽고, 본 의약품과 함께 보관하십시오.