

보령 정로환 당의정

설사를 일으키는 주된 원인은 음식물이나 음료에 의한 소화불량, 식중독, 물과 음식물을 같이 먹은 후의 배탈, 하복부의 냉증, 음주후 장내이상발효 등입니다. 설사가 오랫동안 지속되면, 체력유지에 필요한 영양소와 수분의 흡수가 충분하게 이루어지지 않아 건강에 해롭습니다. 보령 정로환 당의정에는 정선된 크레오소오트, 황백엑스산 및 현초가루가 합리적으로 배합되어 있어 이와 같은 설사에 신속하게 치료효과를 나타냅니다.

성분 · 함량 1정중

크레오소오트(약전)	22.5mg
(구아아콜로서 5.6mg)	
황백엑스산(7.4→1)(별규)	33.75mg
현초가루(약전)	25.0mg

● 이 약은 옅은 분홍색의 원형 당의정입니다.

약리작용 및 특징

1. 각종 배탈 · 설사를 신속히 치유합니다.
본제에는 크레오소오트와 황백엑스산, 현초가루가 이상적으로 배합되어 복용시 각종원인으로 인한 배탈 · 설사에 탁월한 치유효과를 나타냅니다.
2. 냄새가 없고 복용이 편리합니다.
본제는 당의정으로 기존의 크레오소오트의 강한 냄새때문에 복용을 꺼리시는 분들도 거부감 없이 간편하게 복용하실 수 있습니다.

효능 · 효과 설사, 식제, 묽은 변, 토사

용법 · 용량 성인 : 1회 4정 소아 : 1회 11~14세 3정, 8~10세 2정
1일 3회 식후에 복용하십시오.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부, 신생아
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
1) 발열을 수반하는 설사환자, 고령자, 혈변환자 또는 점액변이 계속되는 환자
2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
3. 부작용
이 약을 투여하는 동안 드물게 식욕부진, 위부불쾌감 등이 나타날 수 있습니다.
4. 일반적 주의
1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지켜십시오.
2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여하십시오.
3) 수밀간 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
4) 1주 이상 계속하여 투여하지 마십시오.
5. 소아에 대한 투여
이 약은 7세 이하의 영 · 유아에게 투여하지 마십시오.
6. 저장상의 주의사항
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 12, 48, 500, 1000정

※ 만약, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

본제품은 소비자피해보상규정(제정경제부 고시)에 의거 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

본제품에 대한 문의사항은 당사 소비자상담실 수신자부담전화 080-708-8088로 문의하십시오.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 또는 약사와 상담하십시오.

※ 이 청문서 작성일자(2005년 4월 10일)이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 www.boryung.co.kr 또는 소비자상담실 수신자 부담전화 080-708-8088에서 확인할 수 있습니다.

010405

제 조 및 판 매

BORYUNG

보령제약주식회사

경기도 안산시 단원구 신갈동 1122-3

www.boryung.co.kr