※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

과식 · 소화불량에

KGMP 적격업체제품

겔타제 ㊞정

일반의약품
분류번호:233

겔타제 정은 바쁘게 살아가는 현대인의 불규칙한 식사와 과음, 과식 및 각종 스트레스등에서 기인한 위장병의 치료에 탁월한 효과를 발휘하며 탄수화물, 단백질, 지방의 소화촉진작용과 건위작용, 소화관의 경련성 수축으로 인한 통증을 완해시키며 강인한 흡착력으로 신속히 위벽에 보호막을 형성하여 위장을 보호하기 때문에 위산을 신속히 중화시켜 속쓰림을 제거하여주는 위장병 치료의 4중주 역활을 하여주는 특수하게 복합처방 및 설계된 종합소화제 입니다.
그러므로 겔타제의 등장은 매우 뜻이 있다 할 수 있습니다.

【성분 · 함량】 1정중

주성분 : 당약가루 (JP)	5㎎
메타규산알루민산 마그네슘(식품의약품 안전청고시 제98-127호)	150㎎
비오디아스타제 2000Ⅱ(식품의약품 안전청고시 제98-127호)	60㎎
비오타미라제 1500(식품의약품 안전청고시 제98-127호)	7.5㎎
스코폴리아엑스(약전)	5㎎
(히요스시아민으로서 0.03㎎)	
용담가루(약전)	37.5㎎
탄산수소나트륨(약전)	200㎎
호미카엑스(약전)	5㎎
(스트리키닌으로서 0.34㎎)	

【성　　상】
백색의 원형 필름 코팅 정제

【특　　징】
1.소화작용
겔타제 정은 탄수화물, 단백질, 지방의 소화 촉진작용을 합니다.
2.건위작용
겔타제 정은 위장운동을 촉진시켜 소화를 촉진시키는 작용을 합니다.
3.진통 · 진경작용
겔타제정은 소화관의 경련성 수축으로 인한 동통을 완화시켜 줍니다.
4.제산작용
겔타제 정은 강인한 흡착력으로 위벽에 신속히 보호막을 형성하여 위장을 보호하고 위산을 중화시켜 속쓰림을 제거해 줍니다.

【효능 · 효과】
위산과다(위염, 위 · 십이지장 궤양에 관련된 것도 포함), 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림, 식욕감퇴(식욕부진), 소화불량, 과식, 소화촉진
※다른 용도 사용시 심한 부작용이 나타날 우려가 있으니 주의하십시오.

【용법 · 용량】
성 인 : 1회 2정
소 아 : 1회, 11~14세:1~2정, 8~10세:1정
1일3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】
1.금기
투석요법을 받고 있는 환자
2.다음 환자에는 신중히 투여할 것
1)인산염 저하가 있는 환자
2)약으로 알레르기 증상(발진, 가려움등)을 일으킨 일이 있는 환자
3)다른 약물을 투여받고 있는 환자
3.부작용
1)이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
2)이 약을 투여하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타날 수 있다.
3)이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있다.
4.일반적 주의
1)장기연용을 하지 않는다.
2)신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다.
3)정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
4)2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
5.상호작용
위장진통, 진경제와 병용투여하지 않는다.
6.소아에 대한 투여
이 약은 7세미만의 영 · 유아에게는 투여하지 않는다.
7.저장상의 주의사항
1)소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2)직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
3)오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】 밀폐용기

【사용기한】
외부포장에 표시된 사용기한내에 사용하십시요.

【포장단위】 10, 20, 50, 100, 500, 1000정

*만약 유통과정중 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국 · 병원 개설자에 한하여 교환해 드립니다.

개정일자:030822

삼남제약주식회사
KGMP공장 : 충남 금산군 금산읍 상리 99-1
소비자상담창구 : 041)754-3771