정 부 공 인
KGMP
우수의약품 지정업체

일 반 의 약 품
분류번호 222

벤프로페린정20mg

환경오염문제가 날로 심각하게 대두되고 있는 현대사회에 있어서 오염된 공기는 각종 질병을 유발하며 특히 기관지염이나 상기도염, 폐결핵과 같은 질환이 발병하여 호흡이 곤란하거나 심한 기침을 하게 됩니다.
넬슨 벤프로페린정은 비마약성 진해제로 중추신경에 작용하여 기침을 억제하는 작용이 강력하며 위의 질환으로 인한 기침으로부터 해방시켜 드립니다.

【원료 약품 및 분량】 1정중
인산벤프로페린(식품의약품청고시)·····26.33mg
(벤프로페린으로서 20mg)

【성　　상】 암갈색의 원형 당의정

【약 리 작 용】
넬슨 벤프로페린정은 동물실험에서 기침억제력이 코데인에 비해 2~4배 강력해 폐 및 흉막에는 수용체로부터 발생되는 구심성 지각신경 임팔스를 차단하여 말초적인 작용을 합니다. 또 코데인과 달라서 호흡을 억제하지 않고 기침중추를 억제하여 심한 기침의 횟수와 고통을 감소 시키는 작용을 갖고 있습니다.
넬슨 벤프로페린정은 진경제인 Papaverine과 같은 효과를 갖고 있으며 십이지장 및 담관의 경련 혹은 수축 및 변비의 원인이 되지도 않으며 습관성 및 탐닉성이 관찰된 바 없습니다.

【효능　효과】
주효능　효과:
다음 질환에 의한 기침 : 감기, 급만성기관지염, 상기도염(인두염, 후두염), 폐결핵

【용법　용량】
벤프로페린으로서 보통 성인 1회 20~40mg(1~2정)을 1일 3회 경구투여합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】
1. 일반적 주의
   정제를 구강내에서 씹으면 구강점막의 마취효과를 나타낼 수 있으므로 그대로 삼키십시오.
2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   이 약에 과민증 환자
3. 부작용
   1) 정신신경계 : 때때로 졸음, 현기, 피로, 불쾌감 등의 증상이 나타나는 수가 있습니다.
   2) 소　화　기 : 때때로 식욕부진, 복통, 위부불쾌감, 속쓰림, 구갈 등의 증상이 나타나는 수가 있습니다.
   3) 과　민　증 : 발진 등의 과민증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하여야 합니다.
4. 임부에 대한 투여
   동물실험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 이 약의 안정성은 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 차광실온보관, 제조일로부터 36개월

【포 장 단 위】 10정, 100정, 500정, 1000정

* 본 제품의 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질,변패 또는 오손된 의약품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

작성일자 2003. 06

제조 · 판매
NELSON 한국넬슨제약
충북 음성군 금왕읍 쌍봉리 114
소비자 상담실 (02)588-0941