일반의약품

天然토코페롤제제

복합하노백® 연질캅셀

HANOBAC® Fortified Soft Cap.

복합하노백®연질캅셀은 천연토코페롤(d-α-Tocopherol) 단일성분제제인 하노백에 UDCA (Ursodesoxycholic acid), 감마-오리자놀(γ-Oryzanol), 리보플라빈(Riboflavin : $VitB_2$)을 복합처방하여 항산화작용은 물론 지질대사의 개선, 콜레스테롤 함량 감소, 자율신경계의 기능 정상화의 효과가 있어 갱년기 장애로 인한 어깨·목결림, 수족냉증, 가벼운 동상, 현기증 등을 개선시키며 피부, 손톱, 모발의 건강유지는 물론 시력보호에도 우수한 효과를 나타냅니다.

【성분·함량】 이 약 1캅셀(846mg) 중

비타민E(유에스피)	300 I.U.
(디-알파-토코페롤로서 201.34mg)	
우루소데스옥시콜린산(약전)	10.0mg
감마-오리자놀(식품의약품청고시 제 98-127호)	10.0mg
낙산리보플라빈(약전)	2.0mg
파라옥시안식향산메칠(약전)	0.24mg
파라옥시안식향산프로필(약전)	0.06mg

【성상】 이 약은 갈색투명한 유상내용물을 함유한 투명한 장방형의 연질캅셀제입니다.

【효능·효과】

● 비타민의 보급

이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
비타민E : 말초혈행장해 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·냉증

【특징】

● 항산화작용
- 인체내 유해한 활성산소와 유리기 제거
- 피부노화방지 및 유독산화물 생성억제

● 자율신경계의 기능 정상화
-호르몬분비 조절
-시상하부 및 대뇌변연계 부활

● 지질대사의 개선
- 과산화지질 생성억제, 분해
- 노화 및 성인병 예방·치료에 효과

● Cholesterol 함량 감소
- Cholesterol 합성 억제
- 신진대사 촉진

【용법·용량】 1일 1회 1캅셀씩 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
   2) 3개월 미만의 영아
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)
   1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
   2) 임부, 수유부
3. 부작용
   1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 식욕부진, 복부팽만감
   2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
   3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
4. 일반적 주의
   1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
   2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
5. 임상검사치에의 영향
   요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
6. 저장상의 주의사항
   1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
   2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
   3) 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】 밀폐용기

【포장단위】 60, 90, 180캅셀

※ 보관시 직사 광선이나 고온 다습한 곳을 피하여 주십시오.

제조판매원

東亞製藥(株) 동아제약(주)

본사 : 서울특별시 동대문구 용두동 252

공장 : 충청남도 천안시 차암동 404

HANF-3D006

설명서 작성년월일 : 1997.10.

설명서 개정년월일 : 2003. 4.

®등록상표

※사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질 또는 오손된 의약품을 구입하였을 경우에는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.(문의전화: (02)920-8261, 8382)