

은행엽엑스(EGb761)는 플라보노이드, 테르페노이드(ginkgolides, bilobalide) 및 유기산 등의 상승작용으로 강력한 항산화작용을 갖고 있습니다. EGb761은 뇌와 말초부위를 포함한 인체의 정상혈행을 유지하고, 동맥과 모세혈관의 탄성을 유지하여 효율적 혈액순환을 촉진합니다. 또한 EGb761은 뇌와 CNS의 혈행을 증가시킴으로써 신경세포간의 정보전달 속도를 증가 시켜줍니다.

성분·함량

1밀리리터 중

은행엽엑스(별규) 3.5mg

성상

얇은 갈색의 액이 충전된 갈색 앰플

약리작용 및 특징

1. 세포막의 안정화, free radical에 의한 독성 및 지질과산화 억제, PGI₂ 합성 촉진작용을 나타냅니다.
2. 다음 매개물질의 합성저해 및 길항작용을 나타냅니다.
TXA₂, histamine, bradykinin, serotonin, leucotriene 및 PAF
3. 당대사에 약영향을 미치지 않아 당뇨병 환자에게 적합합니다.

효능·효과

- 뇌혈액순환장애 및 뇌영양장애(뇌혈관부전), 다음 증상을 수반하는 뇌기능장애 : 지적 및 감각능력 저하, 어지러움, 이명, 두통, 시력장애, 기억력감퇴, 불안, 우울감, 내이성 난청, 혈관성·대사성·경부증상으로 인한 청각 및 언어능력 저하
- 동맥경화성 혈관증, 괴저 상태의 당뇨병성 혈관손상, PAOD-(말초동맥폐색질환 또는 간혈성파행증)폐색성혈관내막염, 레이노드병과 기타 호르몬성 및 신경성 혈관장애, 혈관증, 혈관증으로 인한 영양장애 등과 같은 말초동맥순환장애

용법·용량

- 1일 5~10ml를 근육주사 또는 정맥주사 하거나 2일마다 15ml를 정맥주사합니다.
- 급성치료시 : 1일 25ml를 정맥주사 또는 점적 정주합니다.
- 중증치료시 : 1일 25~50ml를 정맥주사 또는 점적정주합니다.

사용상의 주의사항

1. 경고
앰플 주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화될 수 있도록 신중하게 절단 사용 하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의 하십시오.
2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
1) 이 약에 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자
2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
3. 이상반응
1) 드물게 가벼운 위장장애, 특히 알러지가 있는 환자에게는 순환기장애 증상(저혈압, 현기증, 두통, 열감, 개인에 따라 심박동장애), 불면, 알러지성 피부증상이 일어날 수 있습니다.
2) 개인에 따라 부분적으로 다소 빈번하게, 말단 부위의 통증, 위장장애, 발열, 오한, 속 등이 관찰됩니다.
3) 피로, 만성기도폐색, 하지부종, 협심증 유사 증상이 나타날 수 있습니다.
4. 기타
이 약은 당 대사에 영향을 주지 않는다는 보고가 있습니다.

저장방법

차광밀봉용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

· 5ml×5, 10, 50, 100 앰플

- 본의약품은 KGMP 적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과 되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의 및 이 첨부문서의 작성일자(2006년 10월 23일) 이후 변경된 내용의 확인은 홈페이지(www.yuyu.co.kr)나 크로바서비스(수신자요금부담) 080-900-0066으로 하시기 바랍니다.

제조사

yuyu (주)유유

서울사무소 100-828 서울시 중구 신당동 358-9 유유빌딩

본사·공정 390-250 충북 제천시 청암동 983

www.yuyu.co.kr

Under the agreement of
Dr. Willmar Schwabe
GmbH, Germany

LT0880-01