

GAVICON-S

성분·함량 (1정 중)

수산화알루미늄 탄산마그네슘 혼합건조겔
(식품의약품 안전청고시 제 1998-127호) 250mg
탄산마그네슘 (약전) 80mg

성상 백색 내지 유백색 원형정제.

효능·효과

위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토,
위통, 신트림

용법·용량 성인 1회 4정, 1일 3회 식간에 복용합니다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

1) 투석요법을 받고 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여합니다.

1) 신장장애 환자

2) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자

3. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜주십시오.

2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를
중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

GST-0506



8 806046 001115

GAVICON-S

개비콘[®]에스정

속쓰림·위산과다 (제산제)

500정

일반의약품

yuyu

3) 장기연용을 하지 않습니다.

4) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와
상의하십시오.

4. 부작용

이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있습니다.

5. 소아에 대한 투여

이 약은 7세 이하의 영·유아에게 투여하지 않습니다.

6. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여
보관하십시오.

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지
마십시오.

저장방법 기밀용기에 넣어 건조한 곳에 보관하십시오.

포장단위 10, 50, 100, 168, 500정

본 의약품은 KGMP 적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는
유효기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

제품에 관한 문의 및 이 첨부문서의 작성일자(2005년 07월 01일) 이후 변경된 내용의 확인은

홈페이지(www.yuyu.co.kr)나 크로바서비스수신자요금부담 080-900-0066으로 하시기 바랍니다.

제조원

yuyu(주)유유

서울사무소 100-828 서울시 중구 신당동 358-9 유유빌딩

본사·공장 430-804 경기도 안양시 만안구 석수동 212

www.yuyu.co.kr

제조번호 :

사용기한 :



문리배출