

잇몸 조직의 염증증 치주질환이 발생하면 이가 시리고 흔들리며 붓게되어 출혈되기 쉽고 치육 및 치조로부터의 농, 치육맹창, 치아의 이완 등요, 뼈의 소실 등이 일어나며, 구취가 나고 입안이 불쾌해집니다.

치탄 캡슐은 일반적인 항 염증제와는 달리 잇몸조직의 손상된 부위를 소염시키고 말초혈관 혈행을 촉진시켜 염증을 개선시켜주며 치은염 및 치조농루에 의한 여러 증상을 완화시켜 주는 작용이 있는 여러가지 성분을 이상적으로 배합한 잇몸질환 치료제입니다.

[성분 · 함량] 1캡슐 중

동글로로필린나트륨(KPC)	20mg
염화리소짐(KPC)	30mg(약가)
직타용아스코르빈산 97%(별규)	154.5mg
(아스코르빈산으로서 150mg)	
50% 초산도코페롤(KPC)	60mg
(초산도코페롤로서 30mg)	

[성 상] 연녹색~회녹색 분말이 든 초록색의 경질캡슐제

[약리작용]

1. 치주조직 염증의 경감, 지혈작용
아스코르빈산과 염화리소짐이 상승적으로 작용하여 치조농루 및 치육염에 수반하는 발적, 부종, 출혈을 치료합니다.
2. 치주조직의 혈행 개선
초산도코페롤은 치주조직의 말초혈행을 개선시켜 치조농루 및 치육염의 증상을 치료합니다.
3. 구취를 없애줍니다.
동글로로필린나트륨은 농으로 인한 불쾌감과 구취를 없애줍니다.

[효능 및 효과]

치은염, 치조농루에 의한 여러증상(잇몸의 발적, 부기, 출혈, 고름 등)의 완화

[용법 · 용량]

성인(15세 이상) 1회 1캡슐, 1일 3회, 식후 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 환자
 - 2) 지금까지 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(예를들면 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)의 병력이 있는 사람
 - 3) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
2. 이상반응
 - 1) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 (치과의사)와 상의할 것.
 - 2) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막만증후군), 리엘 증후군(중증성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 발열, 홍반, 가려움, 안홍혈, 구내염 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는 발진·발적, 화상양의 수증 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.
4. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 1개월 이상 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의할 것.
 - 3) 이 약은 14세 이하의 소아에게 투여하지 말 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고, 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오염을 막고 품질의 보존을 위해서 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 10, 120, 240 캡슐

- ※ 의약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 본 제품은 우수약품제조 및 품질관리기준(KGMP)을 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중에 변질 또는 파손되거나 사용기한이 경과된 제품은 구입하신 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품 첨부문서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.arlico.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화(080-585-0004)를 통해 확인할 수 있습니다.

개정년월일 : 2007. 5. 9