

ActDayTM Soft Cap.

엑트데이TM 연질캡슐은 동물의 연골에서 추출한 생체활성 물질인 황산콘드로이틴 나트륨과 근육과 신경에 영양을 공급하는 활성비타민 B군, 혈액순환개선작용과 항산화작용이 있는 토코페롤, 자율신경계와 내분비계의 기능을 조절하는 갑파 오리지날의 효과적인 배합으로 신경통, 요통, 건통, 근육통 등 각종 동통성 질환 뿐 아니라 수족저림, 눈의 피로에 효과적이며, 병중·병후 체력저하시, 육체피로, 임부·수유부의 비타민 보충에도 효과적인 콘드로이틴 강화 복합활성형 비타민 제입니다.

■ 원료약품의 분량 : 1캡슐 중

콘드로이틴설페이트나트륨 (KP)	100mg
푸로셀티아민(KP)	50mg
리보플라빈비타이네이트(KP)	5mg
γ-오리지날(KP)	5mg
니코틴아미드(KP)	50mg
피리독신염산염(KP)	25mg
이노시톨(KP)	30mg
판토텐산칼슘(KP)	15mg
시아노코발라민(KP)	30μg
토코페롤아세테이트(KP)	50mg

첨가제(타이색소) - 청색1호, 황색5호, 황색203호, 적색40호

■ 성상 : 등황색(주황색) 유상내용물이 들어있는 장방형의 초코렛색 연질캡슐

- 효능 · 효과**
- 다음 경우의 비타민 D, B¹, B², B⁶, B¹²의 보충 : 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시, 노년기
 - 말초혈행장애 및 갱년기 시 다음증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림, 수족냉증(손발이 차가움)
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등)
 - 각기
 - 눈의 피로
 - 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

■ 용법 · 용량 : 성인 1회 1캡슐, 1일 2회 복용

■ 사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 만 3개월 미만의 젖먹이
 - 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 공 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
 - 레보도파
- 이 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
 - 이 약은 황색5호(선셋 옐로우 FCF, sunset yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부(배부)팽만감
 - 이 약의 투여에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며 출혈이 오래 지속될 수 있다.
 - 에스트로겐을 포함한 경우 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민제를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증

의 위험이 증가될 수 있다.

- 피리독신을 1일 500mg-2g의 용량을 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.
- 폴산이 부족한 환자에게 비타민B₁₂를 1일 10μg이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 발생할 수 있다.
- 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia: 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 우발적으로 과량복용 한 경우
- 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 정해진 용법 용량을 잘 지킬 것
 - 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.
 - 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 존재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

■ 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 90, 180캡슐

■ 제조원 : 삼진제약(주) - 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52(제조의리차) (주)서흥 -충청북도 청원군 오송읍 오송생명로 61(제조자)

※ 주의

- 의약품은 사용하기전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- PTP포장을 개봉하여 복용시 가끔 캡슐체에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용시 캡슐체에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용하십시오.
- 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.

※ 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과 되었거나 변질 · 변색 · 오염되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2015년 10월 30일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)나 소비자 상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)을 통해 알 수 있습니다.

연질캡슐은 제형이 특수하므로 보관상태(온도 30℃이상, 상대습도 75%이상)에 따라 젤라틴 피막이 변형될 수 있습니다. 직사광선을 피하고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하시고, 특히 제품 개봉 후에는 인상에 주의하여 보관하십시오.