일반의약품

분류번호 : 219 기타의 순환계용약

게리란 연질캡슐

Geriran Soft Caps.

노화를 방지하여 회춘하고자 하는 인간의 욕망은 끊임없이 계속되어 왔으며, 어디까지나 노화의 대중요법에 불과한 홀몬요법 · 비타민요법에 의존해 왔을 뿐 그 주된 원인으로 밝혀진 Monoamine oxidase 의 활성을 차단하여 정신적, 신체적 건강을 유지시켜 주는 Monoamine 의 감소를 근본적으로 막아주지는 못했습니다.
게리란 연질캡슐은 노화의 주된 인자인 Monoamine oxidase 라는 효소의 작용을 차단하여 세포의 수명을 연장시키고 항상 젊은 상태를 유지시켜 주는 페니실린 경구용 피임제와 함께 금세기에 개발된 3대 기적의 약물이라 평해지고 있는 GH_3 (염산프로카인)을 함유하고 있는 노화방지 회춘제입니다.
또한 갱년기장애 및 정력감퇴에 약효가 입증된 토코페롤(비타민E), 천연 생약성분인 강정제 Allicin, 혈관 보호작용을 지닌 Hippocastani(서양칠엽수 종자) Extract, 피부연화작용, 항암작용과 시력보호 작용을 가진 비타민A 및 갱년기에 부족되기 쉬운 비타민B군이 보강되어, 노화를 방지하고 회춘하고자 하는 여러분의 욕망을 충족시켜 줍니다.

[약리작용 및 특장]

1. 육체적 기능무력 · 노화현상에 :
   갱년기에 접어들면 인체의 각 기관이나 장기를 이루고 있는 세포의 기능이 감퇴됨으로써 정력과 체력이 눈에 띄게 떨어집니다. 또한 심장의 박동력이 떨어지고 혈관의 탄력성이 저하되어 말초까지 혈액이 원활하게 공급되지 못하는 말초혈관순환장애 등이 오게됩니다. 게리란연질캡슐은 세포호흡과 신진대사를 촉진시켜주고 홀몬분비를 자극하는 GH_3 와 토코페롤, 강정제 알리신, 말초혈행 개선제 히포카스타니 엑스 및 갱년기 이후에 필요한 비타민들이 합리적으로 배합되어 있어 체력과 정력을 증가시킴은 물론 수족냉증, 손발마비감, 관절염, 불면증, 두중감, 시력장애, 피로감 등의 갱년기의 제증상들을 치료해 줍니다.
2. 정신적 기능무력 노화현상에 :
   갱년기에 정신적 노화현상으로 나타나는 가장 전형적인 증상은 옛날일은 잘 기억하면서도 최근의 일은 잊어버리는 건망증(기억력장해)입니다. 건망증은 뇌신경세포의 퇴화와 뇌신경 전달물질(monoamine)의 감소에 기인된 것입니다. GH_3 는 뇌신경세포의 신진대사를 촉진시키고 뇌신경 전달물질인 노르아드레날린, 세로토닌, 도파민 등의 불활성화를 방지함으로써 감퇴된 뇌기능을 회복시켜 뚜렷하게 건망증을 개선시킵니다. 매사를 건성으로 대하게 되는 주의집중력부족, 이랬다 저랬다 하게되는 판단력부족, 셈이 흐려지는 계산력부족, 때와 장소를 구별하지 못하고 쓸데없는 이야기를 하는 지남력저하 등의 증상도 게리란연질캡슐 복용으로 개선됩니다.
3. 정서적 기능무력 · 노화현상에 :
   갱년기가 되면 정서적 불안정이 초래되고 감정의 변화가 심해져, 사소한 일에도 마음이 동요되게 됩니다. 그래서 신경질이 늘고 변덕스럽게 되었다는 말을 듣게 됩니다. 그런데 최근의 연구에 의하면 노화로 인한 우울감과 정신적 퇴화증상 사이에는 서로 밀접한 관계가 있음이 밝혀지고 있습니다. 즉 우울감은 정신적 노화를 촉진시키고, 정신적인 노화는 우울감을 더욱 심화시키다는 것입니다.
   게리란연질캡슐은 항우울작용을 지녀 항상 젊은 기분을 느끼게 하고 마음에 평온감을 주며 권태감, 의욕상실로부터 의욕적인 삶을 살아가게 해주는 정서기능 개선작용도 지니고 있습니다. 게리란연질캡슐은 갱년기 우울감으로 인해 생기는 성욕저하, 두통, 식욕부진 등도 치료해줍니다.

노화현상으로 나타나는 갱년기 장해의 제증상

육체적 기능무력	체력 · 정력감퇴, 말초혈관순환장애(수족냉증,마비감), 관절염, 피부탄력감소, 기미, 잔주름, 두통, 두중감, 불면증, 피로감, 흰머리, 탈모증
정신적 기능무력	기억력장해(건망증), 주의집중력 저하, 판단력 감소, 의욕결핍
정서적 기능무력	우울감, 불안감, 무뚝뚝함, 긴장감

[원료약품 및 그 분량]

1캡슐 중

마늘유(식약청고시)	100mg
(알리신으로서 0.1mg)	
서양칠엽수종자엑스 (식약청고시)	50mg
(에스신으로서 7.5mg)	
팔미틴산레티놀(약전)	5,000 I.U.
질산치아민(약전)	2mg
리보플라빈(약전)	2mg
염산피리독신(약전)	2mg
초산토코페롤(약전)	55mg
염산프로카인(약전)	50mg
파라옥시안식향산메칠(약전)	0.9mg
파라옥시안식향산프로필(약전)	0.18mg

[성　　상] 황색의 내용물이 충전된 갈색의 장방형 연질캡슐

[효능 · 효과] 육체적 · 정신적 노화현상, 기능무력, 말초혈관 순환장애

[용법 · 용량] 성인 1일 1캡슐을 아침, 식후 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고
   임부에 비타민A(레티놀)를 1일 10,000 I.U. 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민A를 5,000 I.U./일 이상 투여하지 않는다. (비타민A 결핍증 환자는 제외)
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   구성성분에 과민증 환자
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   1) 의사의 치료를 받고있는 환자.
   2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
4. 부작용
   1) 소화기계: 위부불쾌감, 설사, 변비, 구역, 구토 등이 나타날 수 있다.
   2) 피　　부: 발진, 발적, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종 등이 나타날 수 있다.
   3) 이 약의 투여에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수도 있다. 출혈이 오래 지속될 경우에는 약사 또는 의사와 상의한다.
   4) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임약을 투여하는 여성, 또는 혈전성 소인이 있는 환자에 비타민E를 투여할 경우에는 혈전 등의 위험이 증가될 수 있다.
5. 일반적 주의
   1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
   2) 이 약의 투여에 의해 부작용이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
6. 상호작용
   설폰아미드제제와 병용투여하지 않는다.
7. 임부에 대한 투여
   외국에서 임신전 3개월로 부터 임신초기 3개월 까지 비타민A를 10,000 I.U./일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경증 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 보고되어 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신을 희망하는 부인에 투여할 경우는 용법 · 용량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A 투여는 5,000 I.U./일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 기울인다.
8. 임상검사치에의 영향
   요의 황변으로 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
9. 저장상의 주의사항
   1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
   2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
   3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

[저장방법] 건냉암소보관, 밀폐용기

[포장단위] 자사 포장 단위

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해 드립니다.
※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사 학술개발부(02-512-9985)로 문의하시기 바랍니다.

TS396-30904

한국유나이티드제약 (주)
충남 연기군 전동면 노장리 404-10

우수의약품 제조관리기준 KGMP 적격업체