

젠 트 연질캡슐

ZENT Soft cap.

젠트연질캡슐은 인체의 결합조직성분인 황산콘드로이틴나트륨을 비롯하여 마늘엑스 및 근육과 신경에 효과적인 여러가지 활성형 비타민이 복합처방된 제제입니다. 젠트연질캡슐은 동물의 연골에서 추출한 생체물질인 황산콘드로이틴을 함유한 제제로서 신경통, 류마티스 관절통 등의 각종 동통성 질환에 뛰어난 효과를 나타냅니다. 그의 체내에서 흡수가 빠르고 효용이 쉬운 생체활성비타민 B₁, B₂, B₆, B₁₂등을 함유하여 근육과 신경에 영양을 공급하고 신체기능을 활성화시킵니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

황산콘드로이틴나트륨 (KPC)	120mg
푸르셀티아민 (KPC)	50mg
마늘엑스(100→1) (KPC)	10mg
낙산리보플라빈 (약전)	6mg
염산피리독신 (약전)	25mg
니코틴산아미드 (약전)	50mg
감마 오리자놀 (KPC)	5mg
판토텐산칼슘 (약전)	15mg
시아노코발라민 (약전)	30μg

【성 상】

등황색의 내용물을 함유한 일면 암적색, 일면 흑갈색의 장방형 연질캡슐

【효능 · 효과】

1. 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 견통 등), 수족저림, 변비, 눈의 피로
2. 각기
3. 다음 경우의 비타민 B₁의 보급 : 육체피로, 임신 수유기, 병중 병후의 체력저하

【용법 · 용량】

8세이상 어린이 및 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
구성성분에 과민증인 환자
2. 다음 경우에는 신중히 투여할 것.
임부, 수유부
3. 부작용
 - 1) 이 약의 투여에 의해 구역, 구토, 묽은 변, 설사, 구내염 등의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 2) 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 발생할 수 있다.
 - 3) 고용량 투여에 의해 소화성궤양을 촉진시키고 당내성 손상, 과요산혈증, 간손상을 일으킬 수 있다.
 - 4) 피리독신을 1일 50mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적증상이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
 - 2) 1개월정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
5. 임상검사치에의 영향
뇨의 황변으로 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사일광을 피하고 될수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.
 - 3) 오염을 피하고 품질을 보호유지하기 위해 다른 용기에 넣지말 것.

【포장단위】 60캡슐, 180캡슐

【저장방법 및 사용기간】

밀폐용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 24개월

* 본 의약품은 우수약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제제입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 소손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

* 이 첨부문서 작성일자(2006년 10월)이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(<http://www.youngilpharm.co.kr>)나 소비자상담실(02-522-7005)에서 확인할 수 있습니다.

* 제조판매원 : 영일제약(주) - 충북 진천군 진천읍 신정리 521-15

설명서개정년월 : 2006년 10월



영일제약(주)
www.youngilpharm.co.kr