



신일 비타민 B₆ 제제 피리독신 정 염산피리독신

일반의약품
분류번호 : 313

피리독신(Pyridoxine)은 1935년 P. Gyorgy에 의하여 비타민 B 복합체의 한 인자임이 증명되었고, 자연중에는 효모, 배아, 간 등에 함유되어 있으나 이는 단백질 등과 굳게 결합하여 있으므로 체내에서의 소화·흡수되기가 극히 어렵습니다.

피리독신은 항피부염인자로서 이의 결핍은 피부염, 급·만성 습진, 구순염 등을 일으킬 뿐만 아니라 특히 화학요법제나 항생제 등에 의한 결핍증상으로 신경장애를 유발하기도 합니다.

신일피리독신정은 아미노산의 산화·합성에 필수적인 보호소 제제로서 각종 결핍증상의 치료제로 임상가들에게 널리 사용되는 비타민 B₆제제입니다.

【성분·함량】 (1정 중)

염산피리독신(Pyridoxine HCl : Vitamin B₆) (약전) 50mg

【성상】

백색의 원형정제

【약리 작용】

1. 피리독신은 생체내에서 피리독신, 피리독살(pyridoxal), 피리독사민(pyridoxamine)의 3가지 형태로 상호 변환하여 존재하며 아미노산의 탈탄산반응, 아미노기전이, 라세미화에 관여하는 필수적인 보호소입니다.
2. 피리독신은 아미노산의 세로막으로의 이동, 불포화지방산의 합성 및 트립토판(tryptophan)의 니코틴산(nicotinic acid)으로의 변환 등에도 관여합니다.
3. 피리독신의 결핍은 피부의 특이적 장애와 신경증상을 유발합니다.

【효능·효과】

1. 비타민 B₆ 결핍증의 예방 및 치료
약물투여(예: 이소니아지드, 하이드랄라진, 피라진아미드, 페니실라민)로 인한 경우 포함
2. 비타민 B₆의 수요가 증대하여, 식사로부터의 섭취가 불충분할 경우
소모성 질환, 임부·수유부, 에스트로겐제제(예: 경구피임제) 복용자 등
3. 비타민 B₆ 의존증
비타민 B₆ 반응성 빈혈 등
4. 다음 질환 중 비타민 B₆의 결핍 또는 대사장애가 관여한다고 추정되는 경우
 - 1) 구각염, 구순염, 구내염, 설염
 - 2) 급·만성 습진, 지루성 습진, 접촉성 피부염
 - 3) 말초신경염
 - 4) 방사선장염(숙취,宿醉)

【용법·용량】

○ 성인 : 염산피리독신으로서 성인 1일 10 ~ 100mg를 복용하십시오.
- 비타민 B₆ 의존증인 경우에는 고용량을 투여할 수 있습니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에의 과민반응 환자
 - 2) 리보도파를 투여 받고 있는 환자
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 비타민 B₆의 요구량을 증가시키는 이소니아지드, 페니실라민, 에스트로겐제제(예: 경구피임제)를 복용하고 있는 환자
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 광선경련, 수족마비, 운동실조를 동반한 감각신경증(고용량으로 장기 투여(수개월에 걸쳐 1일 2g 이상 복용)할 경우 나타날 수 있습니다.)
4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
 - 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 3) 임부의 고용량 복용은 신생아, 유아에서 비타민 B₆ 의존성 증후군과의 관련성이 보고된 바 있으므로 주의하십시오.
 - 4) 비타민 B₆ 의존증에 고용량을 투여하는 경우에는 충분한 관찰을 필요로 합니다. 특히 신생아, 영아에게 투여 시에는 소량에서부터 서서히 증량하여 증상에 적합한 양에 도달 하도록 합니다.
 - 5) 고용량 투여 후 일시적인 의존성이 나타날 수 있으므로 서서히 감량하여 중단하는 것이 필요합니다.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
 - 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기간】 차광기밀용기, 3년

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 의약품은 약국등의 개설자에 한하여 당사 담당 영업사원을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

코스닥상장
신일제약(주)



총리배출

설명서 개정년월일 : 2006. 2.13