

센코딜

분류번호 : 238, 하제·완장제 일반의약품

변비는 대장의 운동장애로 인해 배변 회수가 줄어들거나 변의 양이 감소하며 배변시 통증이 발생하는 증상으로, 식욕부진, 구토, 복부팽만 등이 나타날 수 있습니다. 현대인의 불규칙한 식생활 습관, 운동 부족, 스트레스, 올바르지 못한 배변 습관 등이 변비를 유발시킵니다. 센코딜정은 생약 제제인 천궁이 충분히 함유되어 변비 치료제 복용시 나타날 수 있는 복통을 완화시키고 한방에서 사하제로 오랫동안 사용되어온 센나, 대황 등 생약제제와 강력하며 신속한 양약 성분이 배합된 양·한방 복합 변비치료제로서 만성적인 변비에서 나타나기 쉬운 상복부 팽만감, 두통, 어지럼증, 복부 불쾌감 등을 개선시킵니다.

【원료약품 및 그 분량】1정 중

비사코딜(BP)	6.0mg
도쿠세이트나트륨(EP)	20.0mg
센나엽엑스(별규)	11.0mg
(히드록시안트라센유도체로 1.1mg)	
대황엑스(생규)	22.0mg
(안트라퀴논으로 1.98mg)	
천궁건조엑스(별규)	134.5mg
식약처인정타르색소(첨가제) : 청색1호, 청색2호, 황색203호, 황색4호	

【성상】 녹색의 원형 정형성 필름코팅정

【효능·효과】 변비·변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

【용법·용량】 ·15세이상 : 1회 1~2정씩 1일 1회 취침시 복용한다. ·11세이상 ~ 15세미만 : 1회 ½정 ~ 1½정씩 1일 1회 취침시 복용한다.

·7세이상 ~ 11세미만 : 1회 ¼정 ~ 1정씩 1일 1회 취침시 복용한다. 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다.

※ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1) 급성 복부질환(중수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등)환자 2) 장폐색(창자막힘) 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

1) 심한 복통 또는 구역, 구토 환자 2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자 3) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 임부 또는 임신할 가능성이 있는 부인이 이 약에 함유되어 있는 대황의 자궁수축작용 혹은 골반내 장기의 유출작용에 의해 유조산의 위험이 있다.) 2) 수유부(이 약에 함유되어 있는 대황중 안트라퀴논 유도체는 모유중으로 이행되어 유아에게 설사를 야기할 수 있으므로 수유중에는 약물복용을 금지하거나, 수유부에게는 복용하지 않는다.)

4. 다음과 같은 사람은 복용전에 의사, 약사와 상의할 것.

1) 설사, 연변(물변)이 증상이 있는 환자 (증상이 악화될 수 있다.) 2) 현저하게 위강이 허약한 환자 3) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자 (증상이 악화될 수 있다.) 4) 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(부작용이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 우려가 있다.)

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

1) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등이 나타난 경우

6. 복용중 또는 복용후는 다음 사항을 주의할 것.

1) 대황의 사하작용은 개인차가 있으므로 용법·용량에 주의한다. 2) 자극성 완화제는 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 원인을 조사하여야 한다. 3) 다른 한방제제 등을 병용(함께 복용)하는 경우는 함유 생약의 중복에 주의한다. 대황 함유제제는 병용(함께 복용)투여시 특히 주의한다.

7. 일반적주의

1) 정해진 용법용량을 잘 지킨다. 2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여한다. 3) 반드시 필요한 경우 이외에는 10세 이하의 소아에는 투여를 피하는 것이 바람직하다. 4) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

8. 소아에 대한 투여

1) 이 약은 7세 미만의 영아(젖먹이), 유아에게 투여하지 않는다.

9. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 서늘한 곳에 보관한다. 3) 용유(잘못 사용)을 먹고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】 밀폐용기 【포장단위】 10정, 90정, 100정

※ 본 제품은 흡습성이 있으므로 원래의 포장상태로 꼭 보관하여 주시고, 병포장의 경우 개봉 후 항상 용기뚜껑을 닫아서 습기가 적은곳에 보관하십시오.
 ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
 ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시에 의거 소비자의 피해를 보상해 드립니다.
 ※ 본 제품은 복용할때에 정제에 기도에 걸릴 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
 ※ 본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가정보의 변경에 따라 계속 수정됩니다. 작성일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인 의약품서단 (<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 콜로서비스(080-024-0030)에서 확인할 수 있습니다.
 ※ 영·유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

【소비자상담실】 ☎ 080-024-0030(수신자부담 콜로서비스)

【제조사】 광동제약(주) 경기도 평택시 산단로 114

작성일자 : 2015.12.10