의 약 품 분류번호	234
	제산제

시너프® 정

일반의약품

위통 · 메스꺼움에 ——

Sinerf tab.

시너프정은 H_2 수용체 차단제인 Ranitidine과 3종의 제산제를 복합한 제제로서, 초기에 제산제가 위산을 신속하게 중화시키고, 뒤따라 Ranitidine이 과도한 위산의 분비를 억제시켜 위산분비로 인한 상복부의 통증, 메스껍고 가슴이 답답한 증상 등을 신속하게 소실시켜 줍니다.

□ 원료약품의 분량

1정(354mg) 중
염산라니티딘 (U.S.P.) ····· 31.5mg
(라니티딘으로서 ····· 28.227mg)
산화마그네슘 (K.P.) ····· 50.0mg
규산알루민산마그네슘 (식품의약품안전청고시 제98-54호) ····· 125.0mg
(Al_2O_3로서 38.31mg, MgO로서 30.13mg)
수산화알루민산마그네슘 (식품의약품안전청고시 제98-54호) ····· 100.0mg
(Al_2O_3로서 30mg, MgO로서 30mg)
(총 Al_2O_3로서 68.31mg, 총MgO로서 110.13mg)

□ 성 상

백색 원형의 필름코팅정

□ 효능·효과

위통, 속쓰림, 소화불량, 구역

□ 용법·용량

성인 (15세이상, 80세미만) : 1회 2정씩 복용하되 복용후 5시간 이상 지나도 증상이 완화되지 않으면 다시 2정을 복용하십시오. 단, 1일 2회(4정)을 넘지 않도록 하십시오.

□ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 다음 질환으로 치료받고 있는 환자 : 혈액질환, 신장 · 간장질환, 위 · 십이지장질환, 천식 · 류마티스 등의 면역계질환 (때때로 백혈구감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있습니다. 위 · 십이지장 질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복 복용에 조심할 필요가 있습니다.)
   2) 다음 약물을 투여받고 있는 환자 : 스테로이드제, 항생물질, 항암제, 아졸계 항진균제 (때때로 백혈구감소나 혈소판감소 등이 나타날 수 있습니다. 위 · 십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복복용에 조심할 필요가 있습니다)
   3) 적혈구감소증, 혈소판감소증, 백혈구감소증 등의 혈액이상의 병력이 있는 환자 (혈구수의 감소가 증가될 수 있습니다)
   4) 히스타민 H_2-수용체 길항제에 과민증의 병력이 있는 사람
   5) 소아(15세미만) 및 고령자(80세이상) : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며(사용경험이 적습니다), 80세 이상의 고령자에서는 신기능의 저하로 인해 혈중농도가 높아져 약효가 강하게 발현될 수 있습니다.
   6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 하십시오.
   7) 투석요법을 받고 있는 환자
2. 다음 환자에게는 신중히 투여하십시오.
   1) 의사의 진료를 받고 있는 환자 또는 약제를 복용중인 환자 : 약물상호작용에 의해 부작용의 발현 및 효과의 감소가 나타날 수 있습니다.
   2) 약물에 의한 과민증의 병력이 있는 사람
   3) 고령자(65세 이상) : 80세 미만의 고령자에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여합니다.

4) 인후통, 기침 및 고열이 있는 환자 : 심각한 감염증의 우려가 있으며, 혈구감소 등의 혈액이상이 인정될 수 있습니다. 이러한 증상은 이 약의 복용에 의해 증상이 악화되거나 이 약의 부작용을 은폐시킬 수 있습니다.
5) 원인 불명의 체중감소가 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.
6) 복통이 지속되고 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.

3. 부작용

이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 발현될 수 있습니다. 이러한 경우에는 즉시 복용을 중지하고, 의사 또는 약사와 상의하십시오.

1) 알레르기 증상(발진 · 발적, 가려움, 부종), 변비, 설사, 구토, 두통, 어지러움, 근육통 등의 증상이 나타나는 경우 (염산라니티딘의 부작용 증상으로서 이들 증상이 알려져 있고, 드물게 중독한 부작용을 일으키는 경우가 있습니다.)
2) 이 약의 복용후 즉시 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하게 되고 손발이 차가워지며, 식은땀, 숨막힘 등이 나타나는 경우
3) 고열을 동반한 발진 · 발적, 열에 의한 물집 등 심한 증상이 전신피부,입과 목의 점막에 나타나는 경우
4) 목의 통증, 발열, 권태감, 얼굴과 눈꺼풀의 안쪽이 하얗게 변함, 출혈하기 쉽게 됨(치경의 출혈, 비출혈 등)이 나타나는 경우
5) 황달

4. 일반적 주의

1) 3일간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 다른 질환이 있을 수 있으므로 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
2) 2주간을 초과하여 연용하지 마십시오.
3) 이 약을 복용할 시에는 알콜음료는 섭취하지 마십시오. (혈중 알콜농도를 높일 수 있음)
4) 정해진 용량을 초과하여 복용한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
5) 기재된 효능 이외의 증상에는 복용하지 마십시오.
6) 장기연용을 하지 마십시오.
7) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 상호작용

1) 이 약에 함유된 제산제는 다음 약물들과 상호작용으로 흡수가 저해될 수 있습니다.
   - 테트라사이클린계 항생물질(테트라사이클린 등)
   - 뉴-퀴놀론계 항균제(오플록사신 등)
2) 이 약을 다른 위장약과 병용하지 마십시오. : 다른 위장약을 동시에 병용하면 작용이 강하게 발현되어 예기치 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.

6. 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중으로 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 주의하십시오.

7. 소아에 대한 투여 : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.(사용 경험이 적습니다)

8. 고령자에 대한 투여 (65세 이상) : 80세 미만의 고령자에 대해서도 생리기능저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여하십시오.

9. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사광선이나 고온인 장소를 피하고 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
3) 오용을 피하고 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

□ 포 장 단 위

12, 24, 36, 48, 60, 120정

□ 저 장 방 법

밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

□ 교환 및 제품문의

이 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질 · 부패 또는 오손된 제품 등은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다. 또한 제품에 관한 문의사항이 있으시면 연락주십시오.

연락처 : 마케팅팀(02)840-6708, 고객보호팀 (수신자요금부담) 080-587-8531

국민건강을 선도하는
주식회사 중외제약
경기도 화성시 태안읍 안녕리 146-141
http://www.cwp.co.kr

첨부문서 작성년월일:2004.6.26
이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(http://www.cwp.co.kr)
에서 확인할 수 있습니다.

SIRF-1-KR-0406-B 덕신-05