

\*2002년 7월 1일부터 재조율 책임법이 시행되고 있습니다.

의사나 약사께서는 부작용을 예방하고 올바른 약물 사용을 위해 약물사용 전 다음 사항을 반드시 읽고 숙지하십시오.

1. 사용전 반드시 설명서를 주의깊게 읽어보십시오.
2. 정해진 용법과 용량을 준수하십시오. (이 약을 장기간 사용할 때는 반드시 의사나 약사와 상담하십시오.)
3. 이 약은 외용으로만 사용해야 합니다. 입안, 눈, 질경이 등에 사용하지 않습니다.
4. 어린이는 반드시 보호자의 지도감독하에 사용하십시오.
5. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
6. 직사광선이 들어오는 곳에 보관하십시오.
7. 사용후각과 간혹한 곳에 보관하십시오.

★ 소비자 상담전화 : 080-022-2200

(일반의약품)



항진균제

**라비나** 크림

(염산테르비나핀)

흔히 무좀이라고 불리는 지간형 족부백선은 진균감염에 의한 질환으로 적절한 항진균제 투여가 효과적인 치료법입니다. 라비나크림은 allylamine계 약물로서 낮은 농도에서도 피부사상균, 곰팡이 등에 살진균작용을 가지는 항진균제로 지간형 족부백선의 경우 치료기간이 1주에 지나지 않는 우수한 임상효과를 보이는 약물입니다. 라비나크림은 진균세포막에서 스쿠알렌 에폭시다제의 작용을 저해함으로써 살진균(fungicidal)작용을 나타냅니다.

**【성분·용량】** 이 약1g 중

염산테르비나핀(염류) ..... 10mg

(테르비나핀으로서 8.888mg)

벤조일글루콜(K.P) ..... 10mg

**【성상】** 백색의 크림제

**【효능·효과】**

1. Trichophyton(*T. rubrum*, *T. mentagrophytes*, *T. verrucosum*, *T. violaceum*), *Microsporum canis* 및 *Epidermophyton floccosum*과 같은 피부사상균에 의한 피부진균감염증 : 족부백선 (완선), 체부백선
2. *Pityrosporum orbiculare*(*Malassezia furfur*)에 의한 아루라기
3. 피부칸디다증

**【용법·용량】**

1일 1~2회 발부에 바릅니다.

질환에 따른 치료기간은 다음과 같습니다.

1. 족부백선 : 1~4주
- 지간형 족부백선 : 1일 2회 1주
2. 체부백선, 고부백선(완선) : 1~2주
3. 피부칸디다증 : 1~2주
4. 아루라기 : 2주

치료기간 이후에도 임상적인 증상이 개선되지 않으면 진단을 다시 해야 합니다.

**【사용상의 주의사항】**

1. 다음 환자에는 투여하지 않습니다.

- 1) 테르비나핀 및 이 약 성분에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 알부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
- 3) 유·소아

2. 부작용

피부의 두드러기, 발적, 홍반, 가려움, 자극감, 국소의 접촉피부염, 피부박진, 지통(刺痛), 적열감이 적용 부위에 나타날 수 있으며, 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지합니다.

3. 일반적 주의

- 1) 과도한 자극이 나타나거나 더 심해지면 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
- 2) 의사의 지시가 없는 한 알코올대접 또는 포장병을 사용하지 않습니다.
- 3) 이 약에 대한 반응이 나타나지 않으면 진균학적인 검사를 실시하여 다른 병원균에 의한 감염 여부 확인 후 다른 항진균요법을 시행합니다.
- 4) 신장에서 칸디다균의 농도가 잘 되므로 칸디다증의 경우에는 신장 비누를 사용하지 않습니다.
- 5) 손상되지 않은 피부에 있어서 이 약의 제형수율이 낮아서 전신적 효과가 나타날 가능성은 희박하나 상처부위, 넓은 부위, 영아(표면적/체중의 비율 및 배내로의 밀봉 효과)의 경우에는 전신적 효과가 나타날 수 있으므로 주의합니다.

4. 안부 및 수유부에 대한 투여
  - 1) 동물에 대한 생식독성실험에서 태지독성의 위험성이 보고되지는 않았지만, 임신중의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 안부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 처방상의 유의성이 위험성을 상충한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
  - 2) 이 약은 모유로 분비되므로 이 약을 투여중인 수유부는 수유를 중단합니다.
5. 소아에 대한 투여
 

소아에 대해 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 이 약을 소아에 투여하지 않습니다(유·소아에 대한 사용경험이 적습니다).
6. 교량투여시의 처리
 

실수로 이 약을 복용한 경우에는 위세척 등의 적절한 처치를 합니다.
7. 적용상의 주의
  - 1) 이 약은 외용으로만 적용합니다.
  - 2) 인과응으로 각막, 결막에 사용하지 않습니다. 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 충분한 양의 물로 완전히 씻어 냅니다.
  - 3) 손톱, 두피, 입주위 및 질부위에 사용하지 않습니다.
8. 저장상의 주의사항
 

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
9. 기타
 

모르모트를 대상으로 한 동물실험에서 약한 광독성이 나타났다는 보고가 있습니다.

**【저장방법】** 기밀용기, 실온보관

**【사용기간】** 3년

**【포장단위】** 10g, 15g, 30g 튜브

- ※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- ※ 유효기간·사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 의약품등은 약국등의 개설자를 통하여 분사 영업부(TEL. 031-781-9081/9)에서 교환하여 드립니다.
- ※ 기타 자세한 사항은 동봉한 설명서 또는 홈페이지를 참조하십시오.
- ※ 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 분사 영업부/기밀부(TEL. 031-781-9081/9) 또는 홈페이지에서 확인될 수 있습니다.
- ※ <http://www.kukjepharm.co.kr>

가장 좋은 약은 사람입니다.



최초발매인  
**국제약품공업주식회사**  
경기도 안산시 단원구 초자동 648번지

설명서 개정일 : 2001년 12월 27일

2007. 12. 10