



머릿니 제거 삼푸 감마린액

(린 단)

전문약품
분류번호 : 265

머릿니의 퇴치를 위해 조기발견과 감마린액의 사용방법을 잘 읽고 사용하여 주십시오.
※첨부한「Q & A」란에 기재한 사항을 읽으시면 효과적인 머릿니 퇴치에 도움이 됩니다.

【원료약품 및 그 분량】 100g 중

린단(USP) 1g

첨가제(타르색소) : 청색 1호

【성 상】 연한 청색의 액체

【용능 · 요과】 머릿니, 사면발이

【용법 · 용량】 반드시 지시한 대로만 사용하여 권장용량을 초과하지 않는다.

1. 건조 모발에 충분량을 바른다.
 2. 모발 사이에 잘 문질러 바르고 4분간 방치한다. 4분 동안 머리에 샤워캡 등을 쓰지 않는다.
 3. 소량의 물로 거품을 충분히 낸다.
 4. 완전히 행구어 내고 수건으로 깨끗이 닦는다.
- 보통 1회 적용으로治愈된다. 치료 후에도 가려움이 있을 수 있으나 이것은 치료되지 않은 것이 아니라 살아있는 이가 보이지 않는다면 재치할 필요가 없다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
① 신경독성
② 외국에서 고용량, 지나친 노출, 실수 및 고의에 의한 적용, 반복투여 또는 장기간의 적용 후에 발작과 사망이 보고된 바 있다.
③ 지시대로 이 약을 사용한 경우에도 드물게 발작이 보고된 바 있다.
④ 이 약은 유아, 어린이, 고령자 및 체중이 50kg 미만인 자에게 심각한 신경독성 위험이 있을 수 있으므로 주의하여 사용하여야 한다.
2. 미숙아 및 발작 질환 환자에 사용하여서는 안 된다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약 성분에 과민증 환자
- 2) 미숙아(피부투과성이 만기의 출산아보다 높으며 간효소가 완전히 발달되어 있지 않다)
- 3) 3세 미만의 영 · 유아
- 4) 임부, 수유부
- 5) 발작 질환 환자 또는 발작의 위험이 있는 환자(예: 두부손상, 뇌종양, 척수종양, 간경화, 심한 알콜중독)
- 6) 이 약의 전신흡수를 증가시킬 수 있는 기타 피부질환(예: 아토피성 피부염, 건선 등)이 있는 환자
- 7) 이/옴에 감염되지 않은 환자 (이 약은 감염증의 예방 목적으로 사용하지 않는다. 감염된 이/옴만을 제거할 수 있다)
- 8) 과거 린단제제를 사용하여 이상반응이 발생한 적이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 유 · 소아
- 2) 중증의 부수적인 질환 환자
- 3) 고령자(저항력이 약화되어 있다)
- 4) 이 약은 프로필렌글리콜이 함유되어 있으므로 이성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 이상반응

- 1) 이 약은 피부로 흡수되어 어지러움에서 발작에 이르기까지의 중추신경계 독성 뿐 아니라, 혈액 및 간에 독성을 나타낼 수 있다. 나이 어린 사람에게는 독성이 더 강하다.
 - 2) 외국에서 과용량, 지나친 노출, 실수 및 고의에 의한 적용, 반복투여 또는 장기간의 적용 후에 발작과 사망이 보고된 바 있다. 지시대로 이 약을 사용한 경우에도 드물게 발작이 보고된 바 있다.
 - 3) 자극, 가려움, 발적, 습진성 발진 등의 국소적인 과민반응이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 이 약 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 4) 미국에서 린단 로오션의 시판 후 다음과 같은 이상반응이 추가적으로 보고되었다. : 탈모증, 피부염, 두통, 통증, 감각 이상, 가려움, 두드러기
- 이러한 이상반응과 린단 제제와의 인과관계는 알려지지 않았다.

5. 일반적주의

- 1) 이상반응을 피하기 위해서 사용법을 잘 숙지하고 지킨다.
- 2) 가려움이 지속되는 것과 재감염을 혼동하지 않도록 한다.
- 3) 이 약 치료의 잔여 효과는 알려지지 않았으므로, 기생동물의 예방을 위한 목적으로 사용해서는 안된다.
- 4) 이 질환은 성적 접촉을 통해서 상대 배우자에게 전염될 수 있다. 따라서 배우자도 함께 검사하고 동시에 치료해야 한다. 제품을 배우자와 같이 사용하지 않는다.
- 5) 소아에 이 약 투여시 보호자의 지도 · 감독하에 사용한다.
- 6) 이 약을 사용하는 동안 매우 더운 공간에 있다가나 뜨거운 물로 목욕하거나 머리카락을 뜨거운 바람으로 말리는 것을 피하도록 해야 한다.
- 7) 이 약을 사용하기 전 1시간 이내에 목욕이나 샤워를 하거나 머리를 감지 않아야 한다. 젖거나 따뜻한 피부는 린단의 피부흡수를 촉진시켜 발작의 위험을 증가시킬 수 있다.
- 8) 약을 발라 문지르는데 도움을 주는 비감염자의 손은 장갑을 착용하여 보호하도록 하며, 사용 후 반드시 손을 잘 씻어야 한다.
- 9) 이 약을 사용한 후 수건으로 머리를 잘 말리고 머리에 죽은 이 및 총체를 제거하기 위해 참빗 등 고운 빗을 사용한다. 다른 사람의 도움을 받는 것이 좋을 수 있다. (젤/크림제)
- 10) 이 약을 사용한 후 최근에 입은 모든 옷, 내의, 베갯잇 및 수건은 뜨거운 물에 세탁하거나 드라이클리닝 해야 한다.
- 11) 전문약, 일반약, 생약제제, 비타민 등 환자가 복용하고 있는 모든 약은 의사에게 알려야 한다. 진정제 또는 수면제 등을 복용하고 있는 경우 의사에게 알려야 한다.
- 12) 환자는 이 약의 적절한 사용법, 사용량, 방치기간 등에 대하여 지도를 받아야 하며, 치료 후에도 가려움이 계속되거나 심지어 악화될 수 있음을 인지하여야 한다. 재치료는 일반적으로 필요하지 않다.

6. 상호작용

- 1) 유제는 이 약의 피부흡수를 촉진시킬 수 있으므로 이 약을 적용하기 바로 전 및 후에 유성 트리트먼트, 유성 헤어드레싱 또는 컨디셔너를 사용하지 않는다(액체에 한함).
- 2) 발작 역치가 낮아질 수 있는 약물(항진성병약, 항우울제, 테오퍼린, 사이클로스포린, 미코페놀레이트포페일, 타크로리무스, 황산클로로핀, 피리메타딘, 이소니아지드, 메페리딘, 방사성 조영제, 중추신경계 작용성 항콜린제, 메토카르바를, 페니실린계, 이미페넴계 및 퀴놀론계 항생제)을 복용하고 있는 환자에게는 이 약을 신중하게 처방하고 주의깊게 관찰해야 한다.

7. 과량투여시의 처치

- 1) 증상 : 이 약을 과량투여 또는 경구로 복용한 경우에 중추신경계의 흥분을 야기할 수 있으며 충분한 양을 투여한 경우에는 경련이 나타날 수 있다.
- 2) 처치 : ① 실수로 복용한 경우에는 즉시 위세척을 실시한다. 유제는 흡수를 촉진시키므로 유성하제보다 염류하제를 투여하여 배출시킨다.
② 중추신경계에 이상이 나타나면 펜토바르비탈, 페노바르비탈, 디아제팜의 투여에 의해서 길항될 수 있다.

8. 적용상의 주의

- 1) 이 약은 외용으로만 적용한다. 경구로 복용하지 않는다.
- 2) 얼굴, 눈, 코, 입 및 다른 점막에 닿지 않도록 주의하여 적용한다. 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 충분한 양의 물로 완전히 씻어 낸다. 자극이 지속되는 경우 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 노출된 상처, 절단, 아픈 곳이 있는 경우 의사 또는 약사의 지시가 없는 한 사용하지 않는다.

9. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것
- 3) 사용하고 남은 오윌 · 오윌의 우려가 있으므로 즉시 버릴 것

【포장단위】 90g, 200g

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

「Q & A」 감마린액 과 머릿니

—반드시 사용전 충분히 흔들어서 사용하십시오.—

본 의약품은 살충작용을 하는 의약품입니다.
보통의 삼푸와는 구별하여 보관하시고
세정목적으로는 사용하지 마시기 바랍니다.

Q1 머릿니의 조기발견은?

머릿니의 성충은 2~4mm로 모근 (두피) 부근에서 주로 발견되며 모양과 색은 깨와 같고, 알은 유백색의 좁쌀모양으로 머리카락의 옆에 단단하게 붙어 있으며 최초에는 모근과 거의 붙어 있으나 시간의 경과에 따라 모발의 성장과 함께 두피로부터 멀어집니다. 간혹 성충과 유충을 발견하기도 하나 대부분은 알 (서캐)의 발견으로 감염을 알 수 있습니다.

Q2 머릿니의 알과 비듬등 다른 것들과 어떻게 구별하나요?

머릿니의 알 (서캐)는 머리카락에 붙어 단단하며 쉽게 떨어지지 않습니다.

머릿니의 알 (서캐)는 부화가 끝난 후에도 붙어 있으며 부화여부가 육안식별이 어렵습니다.

Q3 감마린액의 효율적인 사용방법은?

1. 건조한 머리 또는 머리카락 후 수건으로 물기를 없앤 후 충분한 양을 바릅니다.
2. 모발 사이사이와 두피에 골고루 바른 후 4분간 방치합니다. (4분을 넘지 마십시오)
※눈에 들어가지 않도록 주의 하십시오.
3. 소량의 물로 거품이 잘 나도록 문지른 후 씻어내고 일반 비누나 삼푸로 깨끗이 씻어냅니다.
※감염자가 사용한 빗, 머리핀, 머리띠, 침구류 등을 세척하거나 소독하여야 재발을 방지할 수 있습니다. (70℃ 이상의 물에 30분간)

Q4 7일 후 재사용하는 이유는?

통상 1회로 모든 이 (성충, 유충, 알 포함) 을 제거할 수 있으나, 알의 상태는 겉이 딱딱한 물질로 싸여 있어 약의 흡수가 되지 않았을 경우, 알이 유충으로 부화된 뒤 7~10일후 재사용을 권합니다.

Q5 머릿니는 얼마나 빨리 증식하나요?

알 7~10일 유 충 7~10일 성 충 생식기간1개월 >

머릿니는 통상 생식기간 중 약 300개까지의 알을 낳으며, 그 알은 빠르면 약 2주후 성충이 되어 다시 알을 낳게 되므로 기하급수적으로 증식하여 집단 발생의 원인이 됩니다.
현대의 개선된 주거환경은 좋은 증식조건을 제공함으로 조기발견과 퇴치가 중요합니다.

Q6 재 사용 후에도 이가 남아 있습니다. 어떻게 할까요?

재 사용 후 머릿니가 남아 있다면 아마도 새로운 감염이 일어났을 것입니다. 주변의 감염원인을 제거하여 주십시오. 참고로 가족 중 1명이 머릿니에 감염되었다면 모든 가족들도 감염가능성이 있으므로 확인하여야 합니다. (머릿니 발견시 학교에 통보해 동료들의 머릿니를 함께 제거할 수 있도록 하는 것도 재발방지에 중요합니다.)

Q7 머릿니의 알이 그대로 남아 있습니다. 어떻게 해야 하나요?

머릿니의 알은 죽거나 부화 후에도 머리카락에 단단히 붙어 있게 됩니다.
때어내기 힘들지만 손톱이나 가는 빗 (참빗) 으로 정성껏 때어주십시오.
(베이비 오일을 사용하여 잘 문지른 후에 때어내면 도움이 됩니다.)

Q8 머릿니가 개나 고양이등 동물들로부터도 감염될 수 있나요?

머릿니는 사람에게만 기생하는 곤충입니다. 애원동물로부터 감염되지는 않습니다.

* 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
* 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
* 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.
* 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
* 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(http://www.taiguk.co.kr) 또는 식품의약품안전처 온라인의약도서관(http://drug.mfds.go.kr)을 참조하십시오.
* 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
☎ 소비자상담전화 080-300-8282

첨부문서 개정 연월일: 2014. 08. 21

제조 · 판매자
태극제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123
충청남도 부여군 초촌면 금백로 821

M110059-01