

란틴에스정은 위산을 중화시키는 제산제와 위산의 분비를 억제하는 라니티딘염산염이 복합처방되어 위산과다로 인한 속쓰림, 위통 등의 각종 증상을 효과적으로 개선시킵니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

라니티딘염산염(U.S.P.)	31.5mg
(라니티딘으로서 28.27mg)	
규산알루미늄산마그네슘(N.F.)	125mg
산화마그네슘(K.P.)	50mg
수산화알루미늄산마그네슘(K.P.C)	100mg
(Al ₂ O ₃ 로서 30mg, MgO로서 30mg)	
(총 Al ₂ O ₃ 로서 68.31mg, 총 MgO로서 110.13mg)	
첨가제(타르색소) : 황색4호 알루미늄레이크, 청색1호 알루미늄레이크	

【성상】 옅은 황녹색의 원형 필름코팅정

【약리작용 및 특징】

1. 신속한 위산 중화 효과

란틴에스정은 제산제인 규산알루미늄산마그네슘, 산화마그네슘, 수산화알루미늄산마그네슘을 함유하고 있으므로 복용직후에 일차적으로 위산을 중화시킵니다.

2. 지속적인 위산 분비억제 작용

란틴에스정은 제산제와 라니티딘염산염이 함께 처방되어 있습니다. 히스타민 H₂-수용체 길항제인 라니티딘염산염은 과도한 위산이 분비되는 것을 억제하는 작용이 있으며, 이 작용은 제산제의 일차적인 위산 중화작용에 뒤이어 나타나므로 위산과다로 인한 속쓰림, 위통 등의 각종 증상을 완화시키는 효과가 있습니다.

【효능·효과】 위통, 속쓰림, 소화불량, 구역

【용법·용량】

성인(15세 이상, 80세 미만) : 1회 2정씩 복용하되 복용후 5시간 이상 지나도 증상이 완화되지 않으면 다시 2정을 복용하십시오.
단, 1일 2회(4정)를 넘지 않도록 합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 투석요법을 받고 있는 환자
- 다음 질환으로 치료받고 있는 환자
혈액질환, 신장(콩팥)·간장 질환, 위·십이지장 질환, 천식·류마티스 등의 면역계 질환(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있습니다. 위·십이지장 질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복 복용에 조심할 필요가 있습니다.)
- 다음 약물을 투여받고 있는 환자
스테로이드제, 항생물질, 항암제, 아플게 항진균제(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있습니다. 위·십이지장 질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복 복용에 조심할 필요가 있습니다.)
- 적혈구 감소증, 혈소판 감소증, 백혈구 감소증 등의 혈액 이상의 병력이 있는 환자 (혈구수의 감소가 증가될 수 있습니다.)
- 히스타민 H₂-수용체 길항제(억제제)에 과민증의 병력이 있는 사람
- 소아(15세 미만) 및 고령자(노인)(80세 이상)
소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며(사용 경험이 적습니다.) 80세 이상의 고령자(노인)에서는 신기능 저하로 인해 혈중농도가 높아져 약효가 강하게 발현될 수 있습니다.
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 주의합니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 의사의 진료를 받고 있는 환자 또는 다른 약제를 복용중인 환자 : 약물 상호작용에 의해 이상반응의 발현(드러냄) 및 효과의 감소가 나타날 수 있습니다.
- 약물에 의한 과민증의 병력이 있는 사람
- 고령자(노인)(65세 이상) : 80세 미만의 고령자(노인)에 대해서도 생리기능저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여합니다.
- 인후(목구멍)통, 기침 및 고열이 있는 환자 : 심각한 감염증의 우려가 있으며, 혈구 감소 등의 혈액 이상이 인정될 수 있습니다. 이러한 증상은 본제의 복용에 의해 증상이 악화되거나 이 약의 부작용을 은폐시킬 수 있습니다.
- 원인불명의 체중감소가 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.
- 복통(배아픔)이 지속되고 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.
- 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에게는 신중히 투여하십시오.

3. 이상반응

이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 발현(드러냄)될 수 있습니다. 이러한 경우에는 즉시 복용을 중지하고, 의사 또는 약사와 상의하십시오.

- 알레르기증상(발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)), 변비, 설사, 구토, 두통, 어지러움, 근육통 등의 증상이 나타나는 경우(라니티딘염산염의 부작용 증상으로 이들 증상이 알려져 있고, 드물게 중독한 부작용을 일으키는 경우가 있습니다.)
- 이 약의 복용후 즉시 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하게 되고 손발이 차가워지며, 식은땀, 숨막힘 등이 나타나는 경우
- 고열을 동반한 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 열에 의한 물질 등 심한 증상이 전신 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우
- 목의 통증, 발열, 권태감, 얼굴과 눈꺼풀의 안쪽이 하얗게 변함, 출혈하기 쉽게 됨(치경(잇몸)의 출혈, 비출혈(코피) 등)이 나타나는 경우
- 황달

4. 일반적 주의

- 장기연용(계속 복용)을 하지 않습니다.
- 신장병(콩팥병)의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의합니다.
- 3일간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 다른 질환이 있을 수 있으므로 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 2주간을 초과하여 연용(계속 복용)하지 마십시오.
- 이 약을 복용할 시에는 알콜음료는 섭취하지 마십시오.(혈중 알콜농도를 높일 수 있습니다.)
- 기재된 효능 이외의 증상에는 복용하지 마십시오.

5. 상호작용

- 이 약에 함유된 제산제는 다음 약물들과 상호작용으로 흡수가 저해될 수 있습니다.
• 테트라사이클린계 항생물질(테트라사이클린 등)
• 뉴클레오타제 항균제(오픈로사신 등)
- 이 약을 다른 위장약과 병용(함께 복용)하지 마십시오.
다른 위장약을 동시에 병용(함께 복용)하면 작용이 강하게 발현(드러냄)되어 예기치 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.

6. 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부

임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중으로 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 주의하십시오.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.(사용경험이 적습니다.)

8. 고령자(노인)에 대한 투여(65세 이상)

80세 미만의 고령자(노인)에 대해서도 생리기능저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여합니다.

9. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 직사광선이나 고온을 피하고 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 오용(잘못 사용)을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

120, 240정

【최신정보 확인방법】

설명서 개정일자 이후 변경된 내용은 당사홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

【제품문의처】

소비자 상담실 : 080-587-7575(수신자 요금부담)

※ 유통과정 중 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 약국개설자 및 의약품판매업자에 한하여 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다.

설명서 개정년월 : 2011.07

<http://www.myunginph.co.kr>

RIT 0711-09



※ 본 의약품을 사용하기 전에 설명서를 주의깊게 읽고, 본 의약품과 함께 보관하십시오.