

위산과다, 속쓰림 치료제

엔티론 정

K G M P

적격업체

일반의약품

분류번호: 234

ENTIRON Tab.

【원료약품의 분량】 1정중

건조수산화알루미늄겔 (약전) 250mg
탄산마그네슘 (약전) 160mg

【성 상】 백색의 원형정제

【작용 및 특징】

1. 위내에 독특한 거품층 형성작용
엔티론정은 위속에 제산제가 함유된 거품층을 형성시켜 위 내용물이 식도로 역류되는 것을 막아 민감한 식도점막을 보호합니다.
2. 국소적인 제산작용
엔티론정은 종래의 제산제와는 달리 위 내용물을 국소적으로 중화시키므로 소화액의 불활성화를 막아 정상적인 소화작용에 지장을 주지않는 우수한 약제입니다.
3. 효과적인 속쓰림 치료
엔티론정은 위속에서 점성이 있는 거품층을 형성하여 위산이 역류되는 것을 막아 주어 위산에 의한 식도염증과 그에의한 속쓰림, 가슴앓이, 신트림을 방지합니다.
4. 효과의 신속성과 지속성
엔티론정은 복용후 30분이내에 pH를 변화시키며, 생성된 거품층을 3시간이상 지속시켜 약효가 오래갑니다.

【효능·효과】

위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림

【용법·용량】

성인 1회 3정을 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
투석요법을 받고 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 신장에 환자
 - 2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
3. 부작용
이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 2) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의할 것.
 - 3) 장기연용을 하지 않는다.
 - 4) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상담한다.
5. 소아에 대한 투여
이 약은 7세이하의 영·유아에게 투여하지 않는다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 되도록 서늘한곳에 보관할 것.
 - 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 제조일로부터 36개월

- * 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- * 이 첨부문서의 작성일자(2005년 7월)이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(<http://www.youngilpharm.co.kr>)나 소비자상담실(02-522-7005)에서 확인할 수 있음.

설명서개정년월 : 2005년 7월



제조발매원

永一藥品工業株式會社

충북 진천군 진천읍 신성리 521-15