

호흡기 질환 치료제

전문의약품
분류번호:222

크란돌시럽

Ambroxol HCl · Clenbuterol HCl

1000mL

제조번호:

사용기한:



생명과학 연구중심 제약기업

테라젠이텍스

경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58

- 성분·함량: 100mL중
암브록솔염산염(BP) 150mg
클렌부테롤염산염(BP) 0.1mg
보존제: 파라옥시벤조산메틸(KP) 90mg
보존제: 파라옥시벤조산프로필(KP) 10mg

- 성상: 오렌지향이 있는 무색의 시럽제
- 효능·효과: 다음 질환에서의 기관지경련 및 점액과다분비: 기관지 천식, 폐기종, 기관지염

- 용법·용량
· 성인 및 소아(12세 이상): 1회 20ml 1일 2회 복용한다.
증세가 뚜렷이 호전된 후에는 1회 10ml 1일 2~3회로 감량할 수 있다.
심한 호흡곤란 환자는 처음 2~3일간 1회 20ml 1일 3회 복용할 수 있다.
· 소아(12세 미만): 연령 및 체중에 따라 1회 2.5~15ml 1일 2회 복용한다.
(추천용량)

연령	체중	1회 복용량
6~12세	22~35kg	15.0mL
4~5세	16~22kg	10.0mL
2~3세	12~16kg	7.5mL
8개월~1세	8~12kg	5.0mL
8개월 미만	4~8kg	2.5mL

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
비후성 심근병증 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 갑상선기능항진증 환자
2) 고혈압 환자
3) 심부전증, 부정맥 등 심질환 환자
4) 당뇨병 환자
5) 중증 신장장애 환자
3. 부작용
1) 정신신경계: 두통, 진전, 근경직, 졸음, 불안, 어지러움, 신경과민, 불면, 흥분, 사지마비감 등이 나타날 수 있다.
2) 순환기계: 심계항진, 빈맥, 혈압변동, 고혈압, 부정맥 등이 나타날 수 있다.
3) 과민증: 발진, 가려움, 혈관부종, 두드러기, 기관지경련, 저혈압, 허탈 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
4) 기타: ALT, AST의 상승, 전신권태감, 부종, 위장장애 등이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
1) 과도하게 투여를 계속하는 경우 부정맥 또는 심정지를 일으킬 수 있으므로 충분히 주의한다.
2) 용법·용량에 맞게 투여하여도 효과가 나타나지 않는 경우에는 이 약이 적당하지 않은 것으로 생각하고 투여를 중지한다. 특히 소아에

투여시에는 사용법을 정확히 지도하고 경과를 충분히 관찰한다.

- 3) β_2 -효능에 의한 심한 혈청 K치의 저하가 보고되어 있다. 또한 이러한 혈청 K치의 저하작용은 코르티코스테로이드제 및 이뇨제의 병용에 의하여 악화될 수 있으므로 중증 천식 환자의 경우에는 특히 주의한다. 더욱이 저산소혈증은 혈청 K치의 저하가 심리듬에 미치는 작용을 증강시킬 수 있으므로 이러한 경우에는 혈청 K치를 모니터하는 것이 바람직하다.

5. 상호작용

- 1) 이 약을 에피네프린, 이소프로테레놀 등의 카테콜아민류와 병용하면 부정맥 또는 심정지를 일으킬 수 있으므로 병용투여하지 않는다.
- 2) MAO저해제나 삼환계 항우울제로 치료중인 환자에게 이 약을 투여하면 이 약의 혈관계에 대한 작용이 증강될 수 있으므로 특히 주의한다.
- 3) 이 약을 프로프라놀롤 등의 비선택적 β -단제와 병용투여하지 않는다.
- 4) 다량의 다른 교감신경흥분제를 투여받고 있는 환자에게 이 약을 투여시에는 주의한다.

6. 임부에 대한 투여

- 1) 동물실험(랫트)에서 임신후기에 투여한 결과 자궁근수축을 억제하여 분만지연을 일으키고 태반통과 및 모유로의 이행이 보고되어 있다.
- 2) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다. 특히 임신초기 3개월 이내에는 주의한다.

7. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

8. 과량투여시의 처리

이 약의 연속투여중 볼 수 있는 과량투여에 의한 증상은 보통 이 약의 투여를 중지하면 소실된다. 또한 이 약의 과량투여시의 적당한 해독제는 심장 선택성 β -단제이나 이를 기관지경련의 병력이 있는 환자에 투여시에는 특히 주의한다.

9. 기타

염산암브록솔의 용량이 변할 경우 드물게 알레르기성 발진이 나타나는 데 일부 특이체질 환자에서는 전신성 알레르기로 될 수 있다.

- 포장단위: 1000mL
- 저장방법: 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관
- 제조판매자: (주)테라젠이텍스(경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58)

- ※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 본 의약품은 우수 의약품 제조관리기준(KGMP) 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
- ※ 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결 기준에 의거, 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 받을 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하세요.
- ※ 표시기재에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국 의약품안전관리원(의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- ※ 이 표시기재의 개정일 이후 변경된 내용은 02)3463-7111이나 www.etexpharm.com에서 확인할 수 있습니다.

CLY10-150818-06

개정일자: 2015. 08. 18



플라스틱
HDPE
뚜껑: OTHER

↑
세워서 보관하세요