



칼슘과 비타민의 2중 효과

세이칼[®]정

일반의약품

분류번호 : 321(칼슘제)

세이칼[®]정은...

체내에 있는 다른 어떤 미네랄보다 더 많이 존재하는 칼슘은 신체 골격과 치아를 형성할 뿐 아니라, 근육의 수축과 이완, 신경전달, 혈액응고 등의 중요한 생리조절기능을 합니다.

칼슘공급의 필요성은 성장, 임신, 수유 등과 같이 신체 요구가 클 때 증가하고, 노령화로 뼈의 용해량이 생성량을 초과하여 손실이 일어나 골격 약화를 초래할 때에도 증가합니다.

비타민 D는 세포 안과 밖의 칼슘 농도를 적절하게 유지하는 역할과 칼슘과 인의 농도를 조절하는 기능을 갖고 있으며, 비타민 C는 혈관·뼈·치아의 성장과 치료에 중요합니다.


리신은 인체에서 생성되지 않아 외부에서 공급해 주어야 하는 필수아미노산입니다.

따라서, 뼈의 밀도가 줄어드는 골다공증이 발생한 후에는 반드시 위 성분들을 보충해 주어야 하지만 골다공증을 예방하기 위하여 미리 섭취하는 것이 더욱 중요합니다.


세이칼정은 칼슘과 비타민 D₃뿐만 아니라, 비타민 C 및 필수아미노산인 리신이 복합 처방된 방부제가 없는 새로운 칼슘보급제입니다.



성장기



임신·수유부



중·장년층

성분·함량

1정 중	
무수인산수소칼슘(KP)	750 mg
글루콘산칼슘수화물(KP)	250 mg
(총 칼슘으로서 243.25mg)	
아스코르브산(KP)	30 mg
콜레칼시페롤파우더(BP)	2.0 mg
(콜레칼시페롤로서 200IU)	
L-리신염산염(KP)	60 mg
첨가제 (타르색소) : 청색 1호, 황색 203호, 적색 40호, 황색 4호	

성상

연녹색의 타원형 정제

효능·효과

칼슘의 결핍 및 기타 칼슘의 보급

용법·용량

성인 및 12세 이상 어린이 : 1회 1정, 1일 2회 식사후 복용합니다.

※ 충분한 양의 물과 함께 복용하시기 바랍니다.

사용상의 주의사항



- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis), 신질환 환자
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분예의 과민반응 환자
 - 12개월 미만의 영아 4) 신결석 환자 5) 중증의 신부전 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린제, 제산제
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민 D 또는 칼슘의 복용을 피하십시오.
 - 임부, 수유부 4) 심장·순환기계기능 장애 환자 5) 신장에 환자
 - 저단백혈증 환자 7) 강심배당체를 복용 중인 환자
 - 항알도스테론제, 트리암테렌을 복용하는 사람(고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.)
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.

상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

 - 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진
 - 장기복용으로 인한 고칼슘혈증 및 결석증
 - 대량복용으로 인한 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용시키십시오.
 - 1개월정도 복용하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있으므로 주의하십시오.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하여 건냉한 곳에 실온보관하십시오.
 - 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.



저장방법

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

사용기한

외부포장에 표기

포장단위

60정, 120정

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 정부의 “소비자분쟁해결기준”에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 이설명서의최근변경된내용은홈페이지(www.yuhan.co.kr) 또는 소비자상담실(080-024-1188)에서 확인하실 수 있습니다.

문안개정년월일 2010. 11. 24
제품의 사용기한은 외부포장에 표기



제조의뢰·판매원

유한양행

본사 : 서울시 동작구 대방동 49-6
공장 : 충북 청원군 오창읍 양청리 807-1
www.yuhan.co.kr
대표전화 : 02-828-0181
소비자상담실 : 080-024-1188
(수신자요금부담)

제조원 : 유한메디카
충북 청원군 오창읍 양청리 807-1