비충혈 제거제

슈페린정

일반의약품
분류번호 222

(염산슈도에페드린)

Pseupherin Tab.

슈페린정은 기관지 평활근의 β2-수용체를 흥분시켜 c-AMP증가에 의한 기관지 평활근을 확장하여 기침 등 상기도 질환을 치료합니다. 슈페린정은 기관지 점막의 α-수용체에 작용하여 염증으로 부푼 점막을 수축시키고 비충혈을 제거합니다.

[원료약품의 분량] 1정 중
염산슈도에페드린 (B.P) ····· 60mg

[특 장 점]
1. 슈페린정은 다른 국소 비충혈제거제와는 달리 반발성 충혈(rebound congestion)을 거의 일으키지 않습니다.
2. 슈페린정은 기관지 질환에 주로 쓰이는 항히스타민제, 진해·거담제, 항생제의 병용요법으로 우수한 효과를 나타냅니다.
3. 슈페린정은 정상혈압을 가진 환자에게 경구 투여했을 때는 혈압상승을 일으키는 경우가 거의 없습니다.
4. 슈페린정은 α-수용체 효능작용으로 점막의 혈관을 수축시켜 비충혈, 울혈, 부종을 감소시킵니다.

[성 상] 백색의. 정제

[효능 · 효과] 다음 질환에 의한 비충혈 : 감기, 부비강염, 알레르기 등 상기도 질환

[용법 · 용량]
·성인 : 염산슈도에페드린으로서 1회 30~60mg 1일 3~4회 경구투여한다. 1일 최대투여량은 240mg이다.
·소아 :
1) 6~11세 : 1회 30mg 2~5세 1회 15mg 1일 3~4회 경구투여한다. 1일 총 투여횟수는 4회를 초과하지 않는다.
2) 6개월~1세 : 1회 15mg 1일 2회 투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
1) 교감신경흥분성 아민류에 과민증 환자
2) 심한 고혈압 환자
3) 심한 관동맥질환 환자
4) 갑상선기능항진증 환자
5) 당뇨병 환자
6) 수유부
7) MAO저해제를 투여중이거나 투여를 중지한 지 2주 이내인 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
1) 전립선비대증 환자
2) 고혈압 등 심혈관질환 환자
3) 디기탈리스재제를 투여 받고 있는 환자
4) 안내압상승 환자
5) 심한 간·신부전 환자
3. 부작용
1) 순환기계 : 심계항진, 빈맥, 부정맥, 안면창백, 저혈압을 수반한 심혈관 허탈이 나타날 수 있다.
2) 정신신경계 : 편두통, 두통, 어지러움, 불안, 긴장, 무력감, 허약, 불면, 환각, 경련, 중추신경계 흥분 또는 억제 등이 나타날 수 있다.
3) 소화기계 : 변비, 구역, 소화장애 등이 나타날 수 있다.
4) 과민증 : 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
5) 비뇨기계 : 때때로 요저류가 나타날 수 있다.
6) 기타 : 구갈, 발한 등이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
7일 정도 투여하여도 증상의 개선이 없거나 고열이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
5. 상호작용
1) 교감신경흥분약과 병용할 경우 이 약의 작용이 증강될 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여한다.
2) 클로르포름, 시클로프로판, 할로탄 등 할로겐화 마취제와 병용할 경우 심실성 부정맥을 일으킬 수 있으므로 병용투여하지 않는다.
3) 고혈압약, 삼환계 항우울약 등과 병용 투여시에는 혈압을 관찰하면서 신중히 투여한다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
2) 모유로의 이행이 보고되어 있으므로 수유 중에는 투여를 피하고 부득이한 경우에는 수유를 중단한다.
7. 소아에 대한 투여
2세 미만의 영아는 약사 또는 의사의 지시에 따라 투여한다.
8. 고령자에 대한 투여
고령자는 특히 이 약에 의한 부작용이 나타나기 쉽고 과량투여시 환각, 경련, 중추신경계 억제 및 사망을 일으킬 수 있으므로 주의한다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

[사용기한] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 자사포장단위

※ 본 의약품은 우수의약품제조관리기준(KGMP)을 필한 제품입니다. 만약 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변폐 또는 오손된 제품을 구입했을 때에는 구입한 약국이나 병·의원을 통해 교환해 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 개발부로 하여 주시기 바라며, 제품의 변경사항은 당사 홈페이지(www.newgenpharm.com)의 각 제품란에 기재 되오니 참고하시기 바랍니다. Tel: 02-876-7777(대)

생명공학벤처제약기업
newgenpharm (주)뉴젠팜
서울시 관악구 봉천7동 1596-7
우수의약품제조관리기준
KGMP적격지정업체

P-3-2-068 0001