

■ 원료약품 및 분량 : 1정 중
오소판물질(K.P.C) 830mg
타르색소) 황색 5호, 황색 203호
동물유래성분(오소판물질/소/장골, 유당수화물/소/우유)

■ 성상 : 황색의 장방형 필름코팅정
■ 효능·효과 : 다음 경우의 칼슘과 인의 보급

1. 골다공증, 골절치유 촉진
2. 임신·수유부
- 용법·용량
1. 골다공증 : 오소판물질로서 성인 1회 1,660~3,320mg 1일 2회 복용한다.
2. 기타 적응증 : 이 약으로서 성인 1회 830~1,660mg 1일 1회 복용한다.
음료와 같이 식전 복용한다.
- 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관
- 사용기간 : 제조일로부터 36개월


※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.
※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품등 정보」를 참조하세요.
※ 소비자상담실 : 02)579-6262
※ 홈페이지 : <http://www.pharvisbio.co.kr>
※ 본 의약품은 우수 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 품질
검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질,
변해, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
작성일자 : OSKT 2009.01.07

판매원 : **광동제약(주)**
경기도 평택시 오곡동 440-2
제조사 : **(주)한국파비스비이오백**
경기도 안산시 단원구 목내동 456-3
제조번호 :
사용기한 :

- 사용상의 주의사항
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis) 환자, 신질환 환자
 - 2) 신결석증의 병력이 있는 고칼슘뇨증 환자
 - 3) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에의 과민반응 환자
 - 4) 12개월 미만의 영아
 - 5) 신결석 환자
 - 6) 중증의 신부전 환자
 2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.
 - 1) 테트라사이클린 : 이 약의 흡수를 저하, 최소 4시간의 간격을 두고 복용
 - 2) 인산염, 칼슘염, 제산제
 3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.
녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
 4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 거동이 불편한 반신불수 환자
 - 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민 D 또는 칼슘의 투여를 피할 것.
 - 4) 심장, 순환기계 기능 장애 환자
 - 5) 요결석 형성의 경향을 보이는 환자, 신장애 환자
 - 6) 저단백혈증 환자
 - 7) 감심배당체를 투여 중인 환자
 - 8) 이 약의 투여 중에는 고용량의 비타민 D를 섭취하지 말 것.

- 9) 불화나트륨을 복용하는 사람(최소 3시간의 간격을 두고 복용)
- 10) 항알도스테론제, 트리암테렌을 복용하는 사람(고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.)
- 11) 치아자이드 이뇨제를 복용하는 사람(이 약의 배설을 저하)
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 변비, 저혈압, 얼굴 달아오름, 심박동불규칙, 구역질, 구토, 피부발진
 - 2) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석
 - 3) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종
6. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 초기에 칼슘이 요를 통해 배설될 수 있으므로 주의할 것 (경우에 따라 결석이 형성되기 쉽다.)
 - 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용할 것.
 - 4) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
7. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하여 건냉한 곳에 실온 보관할 것.
 - 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

오소판물질은 뼈의 생성을 촉진하는 뼈 구성 물질입니다.



▶ 오소판물질(Ossopan Preparations)은 생리대사가 왕성한 2개월 미만 어린 송아지뼈에서 골유효성분을 추출하여 정제된 골생성 촉진 물질입니다.



골다공증 치유 및 예방

오소킨 정

- 골다공증 치유촉진 및 예방
- 골절시 뼈형성에 도움
- 임신·수유부에게 무기질 보급

광동제약(주)

일반의약품
분류번호:321
90정