

씨씨본 정 [침강탄산칼슘]

Cicibon Tablet

원료약품의 분량 1정 중

침강탄산칼슘(약전) 500mg

성 상

흰색의 원형 정제

효능 · 효과

1. 주효능 효과

- 1) 다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다
- 2) 칼슘보급

용법 · 용량

· 성인

1. 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다 : 탄산칼슘으로서 1일 1~5g을 3~4회 분할 경구 투여한다.
 2. 칼슘보급 : 1일 1.5~3g을 1~2회 분할 경구 투여한다.
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상의 주의사항

1. 경고

1일 최대용량 7.5g을 초과하지 않도록 한다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 중증 고칼슘혈증 환자 및 중증 고칼슘노증 환자
- 2) 부갑상선기능항진증 또는 갑상선기능저하증 환자
- 3) 중증 신부전 환자
- 4) 무산증 또는 위산 결핍증 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 신장장애 환자
- 2) 심기능장애, 폐기능장애 환자
- 3) 변비 환자
- 4) 다른 약물을 투여받고 있는 환자

4. 부작용

- 1) 소화기계 : 이 약을 투여하는 동안 구역, 변비 또는 설사가 나타날 수 있고 드물게 위산의

반동성 분비 등이 나타날 수 있다.

- 2) 대사이상 : 고용량 복용에 의해 고칼슘혈증, 알카리증이 나타날 수 있다.
- 3) 장기·대량투여 : 신결석, 요로결석이 나타날 수 있다.
- 4) 과민증 : 가려움증이 나타날 수 있다.
5. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 2) 소아에 투여시킬 때에는 보호자의 지도 감독 하에 투여한다.
 - 3) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의 한다.

6. 상호작용

- 1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용투여하지 않는다.
- 2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내·체액의 pH 상승에 의해 병용약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여한다.
- 3) 다량의 우유와 병용시 우유 알카리 증후군(고칼슘혈증, 고집소혈증, 알칼리증 등)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
- 4) 비타민 D, 치아잇게 이노제와 병용투여시 고칼슘혈증이 나타날기 쉬우므로 주의한다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀정하여 보관한다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

저장방법

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

30, 500 정

본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다.

작성일 이후 변경된 내용은 www.huons.com에서 확인하실 수 있습니다.

작성일 : 2007.02.16

주식회사 휴온스

경기도 화성시 향남면 상신리 907-6
907-6, Sangshin-ri, Hyangnam-myun,
Hwaseong-city, Kyunggi-do, Korea

소비자 상담실(반쯤 및 교환처) : 080-447-4700