

[성분 · 함량] 1캡슐중

항소산엑스(별규)	64.3mg
향부자(약전)	136mg
감초(약전)	34mg
아세트아미노펜제페세림(식품의약품안전청고시 제 98-127호)	112.9mg
(아세트아미노펜 으로서 105.0mg)	
에텐자미드(약전)	75.0mg
dL-메칠에페드린염산염(약전)	6.25mg
클로르페니라민말레산염(약전)	1.25mg
덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(약전)	8.0mg
카페인(약전)	15.0mg

[성상] 담갈색의 과립이 함유된 상 · 하부 미황색의 경질캡슐제

[효능 · 효과] 감기의 제증상(코물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춡고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법 · 용량] 15세이상(성인) : 1회 2캡슐,
11세이상~15세미만 : 1회 1½캡슐, 7세이상~11세미만 : 1회 1캡슐씩을
1일 3회 식후 30분에 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

- 경고
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.
- 다음 사람은 복용하지 마십시오.
 - 지금까지 이 약에 의한 과민증상 [예를 들면, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등)]을 일으킨 적이 있는 사람
 - 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
- 다음 사람은 복용하기 전에 의사 · 약사와 상의하십시오.
 - 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세 이하의 어린이
 - 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
 - 심장에 장애가 있는 사람, 또는 고령자
 - 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨(소변을 누)곤란이 있는 사람
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
 - 의사 또는 치과약사의 치료를 받고 있는 사람
 - 부종(부기)이 있는 환자
- 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오.
 - 용법, 용량을 잘 지키십시오.
 - 다음 약들과는 동시에 복용하지 마십시오.
진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등
 - 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임 하에 복용시키십시오.
 - 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세미만의 영아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋습니다.
- 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의하십시오.
 - 복용하는 동안 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨(소변을 누)곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전조작을 피하십시오.
 - 여러 차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 장기 연용하지 마십시오.
 - 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
 - 이 약의 복용후 곧바로 두드러기, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백해 지고, 수족이 차가워지고, 식은 땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
 - 고열을 수반하며 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 화상 모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
 - 천식이 나타난 경우
 - 본체의 복용에 의해 뇨량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담하십시오.
 - 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 쌍임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(열청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지하십시오.
 - 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지하십시오.
 - 바르비탈계 약물, 삼한계 향유물질 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있습니다.
 - 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로 신중히 투여하십시오.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
 - 오용(잘못사용)을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장 방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 [포장 단위] 자사포장단위

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다. 본 제품은 공정거래위원회 고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 삼익제약 홈페이지(www.samik.co.kr) 또는 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 의약품 정보를 참조하세요. 101125