빅사민® 연질캡슐

일반의약품

항산화 비타민(A,C,E) 미네랄 제제

작 용 · 특 성 : 현대인의 체내에는 대기오염, 흡연, 스트레스, 질병, 식생활의 변화 등에 의해 생화학적 산물인 유리기가 형성됩니다. 이 유리기는 세포에 큰 손상을 일으켜 심장병, 고혈압 및 각종 암, 노화촉진, 백내장, 면역계의 손상을 일으킵니다. 따라서 환경에 의해 생성되는 유리기를 제거해주면 각종 성인병을 예방할 수 있습니다.
빅사민 연질캡슐은 항산화제로 알려진 베타카로틴, 토코페롤, 비타민 C 등 3종의 항산화 비타민과 아연, 구리, 셀레늄, 망간 등 4종의 항산화 미네랄이 고루 처방되어 있는 우수한 제제입니다.

조 성 · 성 상 : 1. 원료약품의 분량 : 1캡슐중

비타민E (U.S.P.)	200IU
	(초산토코페롤 200mg)
아스코르빈산 (약전)	250mg
베타카로틴30% 현탁액 (식약청고시)	10mg
	(베타카로틴으로서 3mg)
산화아연 (약전)	9.337mg
	(아연으로서 7.5mg)
산화제이동 (식약청고시)	1.252mg
	(동으로서 1.0mg)
셀레늄0.1% 가루 (식약청고시)	15mg
	(셀레늄으로서 15.0㎍)
황산망간 (U.S.P.)	4.613mg
	(망간으로서 1.5mg)

2. 성상 : 적색의 유상물질이 든 암갈색의 장방형 연질캡슐

효 능 · 효 과 : 1. 육체피로, 임신 · 수유기의 비타민 C의 보급, 병중 · 병후의 체력저하시 비타민 A, C의 보급 및 노년기의 비타민 E의 보급
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.
말초혈행장해 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨 · 목결림, 수족저림 · 수족냉증

용 법 · 용 량 : 성인 1일 1회 1캡슐씩 식후 복용합니다.

사 용 상 의 주 의 사 항 : 1. 경고
임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000IU이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민 A를 5,000IU/일 이상 투여하지 않습니다.(비타민 A 결핍증 환자는 제외)

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
2) 12개월 미만의 영아
3) 윌슨씨병

3. 다음 환자에는 신중히 투여합니다. (복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 과수산뇨증환자(hyperoxaluria : 뇨증에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
3) 임부, 수유부
4) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
5) 신장애 환자
6) 저단백혈증 환자

4. 부작용
1) 이 약 투여에 의하여 위장관장애, 소화장애, 위부불쾌감, 상복부통증, 구역, 구토, 설사, 변비, 발진, 발적, 가려움증, 건조하고 거친피부, 피부염, 땀 · 호흡시 악취, 탈모, 조급증, 통증성 관절부종, 혼수, 저혈압, 폐부종의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의
1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킵니다.
2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000IU이상을 넘지 않도록 합니다.

6. 상호작용
1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의 합니다.
2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않습니다.
- 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제
3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피합니다.

7. 임부 · 수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여
외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않습니다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는

5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 합니다.

8. 임상검사치에의 영향

각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.

9. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.

3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

저 장 방 법 : 기밀용기에 넣어 실온(1~30℃)에 보관하십시오.

포 장 단 위 : 빅사민 연질캡슐 ····· 30, 60, 100, 200캅셀

구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리 기준) 적격업소 제품

®=등록상표

I03 · 062000

중 근 당

본사 : 서울특별시 서대문구 충정로 3가 368
공장 : 충남 천안시 성거읍 오색당리 15-20
소비자상담실 : 080-6776-080(수신자 부담)