

- 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.
- 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우에는 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

뇌기능 및 말초동맥
순환장애 치료제
동화 은정액®
은행엽엑스

분류번호 : 219(기타의 순환계용약) 일반의약품

DONG WHA EUNJUNG liquid

동화 은정액은 혈관세포를 파괴하여 혈관을 손상시키는 유리기(free radical)를 제거하여 혈관을 보호하고 탄력을 유지하며 혈전생성을 막고 적혈구 파괴를 방지하여 탁한 혈액을 깨끗하게 해줍니다. 또한 혈관을 확장시켜 혈액공급이 원활히 이루어지도록 해줍니다. 동화 은정액은 좁아진 뇌혈관을 확장시켜 뇌혈액순환을 촉진시켜 줌으로써 만성 두통, 어지러움, 귀울림 등의 뇌혈관 질환을 치료해 줄 수 있으며, 손발저림이나 손발시림, 다리 동맥의 혈행장애로 인해 걸으면 다리가 저리고 아픈 간헐성 파행증(이따금 절뚝거림)과 같은 증상을 치료해 줄 수 있는 뇌기능 장애 및 말초혈액순환 개선제입니다.

【원료약품의 분량】 1바이알(20mL) 중

주성분 : 은행엽엑스(생규) 40.0mg

(총 키토플라본배당체로서 9.6mg)

첨가제(보존제) : 벤조산나트륨(KP) 10.8mg

【성상】

갈색 바이알에 든 특이한 향이 있는 연한 황색의 액

【효능·효과】

○ 주효능·효과

- 1) 말초동맥 순환장애(간헐성 파행증(이따금 절뚝거림))의 치료
- 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
- 3) 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

【용법·용량】

1. 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명(귀울림) : 은행엽엑스로서 1회 40mg 1일 3회 또는 1회 80mg 1일 2회 경구투여(복용)하십시오.
2. 기질성 뇌기능장애 : 은행엽엑스로서 1회 40mg-80mg 1일 3회 또는 1회 120mg 1일 2회 경구투여(복용)하십시오.
연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
이 약에 과민증 환자
2. 부작용
드물게 가벼운 위장관(창자) 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있습니다.
3. 이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 마십시오.
4. 임부에 대한 투여
동물실험에서 기형발생은 없었으나 임신 중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적습니다.
5. 소아에 대한 투여
소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 마십시오.
6. 적용상의 주의
이 약은 내복으로만 사용하십시오.
7. 저장상의 주의사항
직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 동화 은정액(은행엽엑스) 30바이알

【문의전화】 본사 : (02)2021-9300, 소비자상담실 : 080-023-1897(수신자요금부담)

【제조사】 (주)동구바이오제약, 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 18

【제조외지자】 동화약품(주) 본사 : 서울특별시 중구 후암로 98, 19층, 공장 : 충청북도 충주시 충주산단1로 167

본 의약품은 KGMP 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다. 본 의약품에 대한 자세한 허가사항은 식품의약품 안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조해주시기 바랍니다.

※이 첨부문서 작성일자(2014년 10월 24일) 이후 변경된 내용은 www.dong-wha.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.



동화약품