

글루콘산제이철나트륨 복염

저장 방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장 단위

30, 60바이알

사용 방법



● 부름의 고리부분을 위로 들어 올립니다.



● 고리부분을 좌측으로 움직여서 끝까지 들어 오게합니다.

- ※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품에 이상이 있을 경우 재정경제부 고시에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- ※ 제품에 대한 의문사항은 보령제약 소비자 상담실 수신자 부담전화 080-708-8088로 문의하십시오.
- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- ※ 이 첨부서 작성일자(2007년 10월 1일)이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 www.boryung.co.kr 또는 소비자상담실 수신자 부담전화 080-708-8088에서 확인할 수 있습니다.

011007

제조·판매업
BORYUNG
보령제약
경기도 안산시 단원구 신길동 1122-3
www.boryung.co.kr

Fe³⁺

일반의약품
분류번호:322

새로운 개념의 빈혈치료제

웨너프®

글루콘산제이철나트륨 복염

액

BORYUNG
보령제약



새로운 개념의 빈혈치료제

웨너프® 액

글루콘산제이철나트륨 복염

성분·함량

1바이알(10mL) 중
글루콘산제이철 나트륨 복염(KPC) 127mg
(Fe(III)로서 44.5mg)
파라옥시안식향산 메칠나트륨(NF) 10.3mg
파라옥시안식향산 프로필나트륨(NF) 1.12mg

성상

갈색 바이알에 든 특이한 향이 있는
적갈색 내지 진한 갈색의 액

효능·효과

철 결핍성 빈혈

용법·용량

성인 : 철로서 1회 44.5mg, 1일 2회 식간에 복용하십시오.
어린이 : 1회 44.5mg, 1일 1회

사용상의 주의사항

- 경고
 - 철 함유제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관 합니다. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락하십시오.
- 다음 환자에는 투여하지 않습니다.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분과의 과민 반응 환자
 - 12개월 미만의 영아
 - 혈색소중철 대사 이상으로 철이 간장, 췌장에 침착하는 질환, 해모 시데린침착증(조직 장애는 일으키지 않으나) 국소적 또는 전신적으로 조직의 (해모시데린으로서의) 철 함유량이 증가하는 상태 환자

- 철 이용 장애(예 : 납 중독으로 인한 빈혈, 철 불용성 빈혈, 지중해 빈혈, 만성성 피부 포로피린증) 환자
- 비철결핍성 빈혈 환자 (예 : 비타민 B₁₂ 결핍으로 인한 거대적아구성 빈혈)
- 골수 부족에 의한 빈혈 환자
- 용혈성 빈혈 환자
- 철 과잉증 환자
- 간염이나 종양으로 인한 철 결핍성 빈혈 환자(철이 세망 내피계에 축적되어 이중에 장애를 받을 수 있으므로 1차 질환이 치료된 후 복용하십시오.)
- 10만신 핵산증 환자
- 1) 간 장애 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 인산염, 칼슘염
 - 경구용테트라사이클린계 항생제
 - 제산제
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.
 - 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차 및 우유 유제품은 복용 또는 복용 전후에는 피하십시오.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오.
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
 - 심장 순환기계기능 장애 환자
 - 발작성 야간 혈색소노증 환자(용혈을 유발하여 병태를 악화시킬 수 있습니다.)
 - 신장염 환자(신부전 환자)
 - 치단백혈증 환자
 - 철 함유제(철분제, M라는 간장 조영제 등을 투여중인 환자
 - 항알도스테론제, 트리암테렌과 함께 복용하는 사람(고칼혈증증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.)
 - 철분 제제와 디아소론산 염류, 티록신, 설프나이드 제제를 동시 복용하는 사람이 (제제를 흡수가 감소되므로 일정한 시간 간격(2~3시간 이상)을 두고 복용하십시오.)
 - 퀴놀론계, 페니실린계, 클로람페니콜, 클레스티라민, 핵장엑스 및 비타민 D와 같은 물질을 복용하는 사람

- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중단 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 중단시 가능한 이 첨부서를 소지하십시오.
 - 두드러기, 가려움, 햇빛 노출시 피부 과민반응
 - 복부·위통증, 위 경련
 - 구토, 설사
 - 열, 혼수
 - 때때로 AST, ALT의 상승, 드물게 ALP 상승
 - 구역, 식욕부진, 변비, 흑변, 치아변색, 위부불쾌감
 - 과량 투여로 인해 구역, 구토, 변비, 설사 등의 위장장애, 식욕부진, 복통, 토혈, 직장염, 무기력, 권태감, 순환장애 또는 고혈당증, 대사성 산증, 간 효소 수치 상승, 색소침착, 고나트륨혈증, 출혈성심부전, 부종, 중독 될 경우 소화 기관의 용혈 유발
 - 과량 투여로 인한 위장관 장애와 소화 부전을 수반한 혈합의 경우에는 구토를 시킨 후 입안염과 우유를 복용시켜 위세척을 하십시오.
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 장해진 용법, 용량을 잘 지켜십시오.
 - 치료를 시작하기 전에 빈혈의 유형과 그 원인을 파악해야 합니다. 빈혈은 혈액 순환과 같은 전신적인 장애에 의해 발생할 수 있으므로 가능한 이러한 원인들이 먼저 치료되어야 합니다(예 : 만성질환에 의한 빈혈은 철분 복용이 유효하지 않을 수 있습니다).
 - 어린이에 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용하십시오.
 - 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 투여 중에는 혈액검사를 실시하고, 과량투여하지 않도록 주의하십시오.
 - 아스코르빈산(비타민 C) 200mg 이상과 함께 복용시 철분의 흡수가 증가 될 수 있습니다.
- 보관상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀폐하여 보관 하십시오.
 - 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.