K G M P
적격업체제품

복통 · 위통 · 속쓰림을 위한 진경제

파로민정

분류번호	124
일 반 의 약 품	

파로민정은 디싸이클로민의 부교감신경 차단 및 직접적인 평활근 경련 차단 작용과 함께 파파베린의 평활근 이완작용의 상승효과로 우수한 진경작용을 나타내는 약물입니다. 특히 UDCA와 ℓ-멘톨의 건위소화작용을 함께 지니고 있어 위장관 장애에 따른 복통, 위통, 속쓰림에 신속하고 확실한 효과를 나타냅니다. 또한 위산분비 억제작용을 지니고 있기 때문에 소화성 궤양에 의한 위장관 통증 및 경련 치료시 제산제 또는 H_2 차단제와 병용 투여 약물로 선택할 수 있는 약물입니다.

【성　　상】
벡색의 원형 당의정

【성분 · 함량】 1정 중

염산디싸이클로민(약전)	5mg
염산파파베린(약전)	15mg
우르소데스옥시콜린산(약전)	5mg
ℓ-멘톨(약전)	5mg

【효능 · 효과】
위통, 복통, 산통, 위산과다, 속쓰림

【용법 · 용량】
성인 1회 2정 1일 2~3회, 8~14세 1회 1정 1일 2~3회 식후 또는 식간에 복용한다. 다만, 1일 2회 이상 복용시에는 4시간 이상의 간격을 두고 복용한다.

【저장방법】
밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】
10, 100, 500, 1000 정

※최신의 정보확인 방법 : 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 본사 소비자 상담실에서 확인할 수 있습니다.

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품일 경우 병 · 의원, 약국 및 도매상에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입처를 통하여 교환 하시기 바랍니다.

(K-1)

제조발매원
JIN YANG PHARM.CO.
진양제약주식회사
본사 : 서울특별시 서초구 서초3동 1532-9 [T:(02)3470-0300]
공장 : 경기도 안산시 단원구 초지동 649-3 [T:(031)494-8196]
고객상담실 : (02)3470-0350 홈페이지 : www.jinyangpharm.com

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   1) 약으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
   2) 심장애 환자, 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 또는 배뇨장애환자, 허약자 또는 고령자
   3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
   4) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
2. 부작용
   1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등) 이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
   2) 이 약을 투여함으로써 구갈, 변비의 증상이 나타날 수 있다. 또 두통, 안면홍조, 눈부심, 배뇨장애 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
3. 일반적 주의
   1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
   2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여한다.
   3) 이 약을 투여함으로써 시야몽롱, 눈부심 등이 나타날 수 있으므로 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
   4) 수회 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
4. 상호작용
   스코폴리아엑스를 함유하는 제제 및 다른 위장진통 · 진경제와 병용투여하지 않는다.
5. 소아에 대한 투여
   이 약은 7세 이하의 영 · 유아에게 투여하지 않는다.
6. 저장상의 주의사항
   1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
   2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
   3) 오용을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.