

위통, 속쓰림에 빠르고 지속적인 이소효과 처방

잔시드 정

잔시드정은 위벽세포의 H_2 -수용체를 차단하여 위산 및 펩신 분비를 억제하는 라니티딘염산염과 3종의 제산제가 복합된 형태로 과잉의 위산으로 인한 위통, 속쓰림, 소화불량, 구역의 증상을 효과적으로 개선합니다.

【원료약품의 분량】 1정 중	
라니티딘염산염(USP)	31.5mg
(라니티딘으로서 28.227mg)	
산화마그네슘(KP)	50mg
규산알루미늄산마그네슘(NF)	125mg
(산화알루미늄으로서 38.31mg, 산화마그네슘으로서 30.13mg, 중 산화알루미늄으로서 68.31mg,	
중 산화마그네슘으로서 110.13mg)	
수산화알루미늄산마그네슘(KPC)	100mg
(산화알루미늄으로서 30mg, 산화마그네슘으로서 30mg, 중 산화알루미늄으로서 68.31mg,	
중 산화마그네슘으로서 110.13mg)	
첨가제(타르색소) : 청색 1호(AI), 황색 203호(AI)	

【성상】 녹색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】 위통, 속쓰림, 소화불량, 구역

【용법·용량】

성인(15세 이상, 80세 미만) : 1회 2정씩 복용하되 복용후 5시간 이상 지나도 증상이 완화되지 않으면 다시 2정을 복용하십시오. 단 1일 2회(4정)를 넘지 않도록 하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 다음 질환으로 치료받고 있는 환자 : 혈액질환, 신장(콩팥) · 간장질환, 위 · 심이식장질환, 천식 · 류마티스 등의 면역계질환(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있습니다. 위 · 심이식장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복 복용에 조심할 필요가 있습니다.)
- 다음 약물을 투여받고 있는 환자 : 스테로이드제, 항생물질, 항암제, 아질계 항진균(곰팡이)제(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있습니다. 위 · 심이식장질환의 치료와 병행하고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복 복용에 조심할 필요가 있습니다.)
- 적혈구 감소증, 혈소판 감소증, 백혈구 감소증 등의 혈액 이상의 병력이 있는 환자 : 혈구수의 감소가 증가될 수 있습니다.
- 헤르페스 H_2 -수용체 길항제(억제제)에 과민증의 병력이 있는 사람
- 소아(15세 미만) 및 고령자(노인)(80세 이상) : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며(사용경험이 적습니다), 80세 이상의 고령자(노인)에게는 신기능의 저하로 인해 혈중농도가 높아져 효과가 강하게 발현(드러냄)될 수 있습니다.
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중으로 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 주의하십시오.
- 특색오염을 받고 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 의사의 진료를 받고 있는 환자 또는 다른 약제를 복용중인 환자 : 약효 상호작용에 의해 부작용의 발현(드러냄) 및 효과의 감소가 나타날 수 있습니다.
- 약물에 의한 과민증의 병력이 있는 사람
- 고령자(노인)(65세 이상) : 80세 미만의 고령자(노인)에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여합니다.
- 인후(구멍)통, 기침 및 고열이 있는 환자 : 심각한 감염증의 우려가 있으며, 혈구 감소 등의 혈액 이상이 인정될 수 있습니다. 이러한 증상은 이 약의 복용에 의해 증상이 악화되거나 이 약의 부작용을 은폐시킬 수 있습니다.

일반의약품
분류번호:234

- 원인불명의 체중감소가 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.
- 복통이 지속되고 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.

3. 이상반응

- 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 발현(드러냄)될 수 있습니다. 이러한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 알레르기 증상(발진, 발적(종혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)), 변비, 설사, 구토, 두통, 어지러움, 근육통 등의 증상이 나타나는 경우(라니티딘염산염의 부작용 증상으로서 이들 증상이 알려져 있고, 드물게 중독한 부작용을 일으키는 경우가 있습니다)
 - 이 약의 복용 후 즉시 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하게 되고 손발이 차가워지며, 식은 땀, 숨막힘 등이 나타나는 경우
 - 고열을 동반한 발진, 발적(종혈되어 붉어짐), 열에 의한 물집 등 심한 증상이 전신피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우
 - 목의 통증, 발열, 권태감, 얼굴과 눈꺼풀의 안쪽이 하얗게 변함, 출혈하기 쉽게됨(치경(잇몸)의 출혈, 비출혈(코피) 등)이 나타나는 경우
 - 황달

4. 일반적 주의

- 3일간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 다른 질환이 있을 수 있으므로 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 2주간을 초과하여 연용(계속 복용(사용))하지 마십시오.
- 이 약을 복용할 시에는 알콜음료는 섭취하지 마십시오(혈중 알콜농도를 높일 수 있음.)
- 정해진 용량을 초과하여 복용한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 기재된 효능 이외의 증상에는 복용하지 마십시오. 6) 장기연용(계속 복용(사용))을 하지 마십시오.
- 신장(콩팥)병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상담하십시오.

5. 상호작용

- 이 약에 함유된 제산제는 다음 약물들과 상호작용으로 흡수가 저하(억제)될 수 있습니다.
- 테트라시클린계 항생물질(테트라시클린 등)
- 뉴클레오타이드 항진제(오로목시딘 등)
- 이 약을 다른 위장약과 병용(함께 복용(사용))하지 마십시오 : 다른 위장약을 동시에 병용(함께 복용(사용))하면 작용이 강하게 발현(드러냄)되어 예기치 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중으로 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 주의하십시오.
- 소아에 대한 투여 : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.(사용경험이 적습니다)
- 고령자(노인)에 대한 투여(65세 이상) : 80세 미만의 고령자(노인)에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여하십시오.

9. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 적시광선이나 고온을 피하고, 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 오용(잘못 사용)을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【포장단위】 20정, 120정, 240정

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【소비자상담실】 02) 834-2607

■ 사용(유효)기간 이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

■ 어린이 손에 닿지 않게 보관하십시오.

■ 최신 의약품 정보 : 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) 참조

■ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

■ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

■ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

【제조회사】 (주)동국약품 / 경기도 화성시 향남읍 상신리 901-3

【제조지】 알리코제약(주) / 충북 진천군 광혜원면 화죽리 160-17

이 첨부파일 작성일(2011. 05. 06) 이후 변경된 내용은 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.

【판매처】 (주)유한메디칼  총복 청원군 오창읍 양정리 807-1
<http://www.yuhanmedica.co.kr>