골관절염 치료제

# 글루사민 캡슐

| 일 반 의 약 품 |
| --- |
| 분류번호:114 |

## GLUSAMIN Cap.

전인구의 20%가 관절염으로 고생하고 있습니다. 그러나 흔히 사용되고 있는 비스테로이드성 소염진통제 등의 기존물질은 통증과 염증을 단기적으로 치료해 주지만 근본적인 치유가 불가능합니다.

**글루사민캡슐**은 관절연골의 대사과정 중에 기질로써 직접 작용하는 활성물질인 결정 글루코사민을 주성분으로 함유하는 제제로서 관절연골의 정상적인 연골생성에 도움을 주며, 손상된 연골에 영양을 주어 원상으로 돌려놓는 역할을 하고, 관절의 활액생성을 증가시켜 윤활작용을 함으로써 관절기능을 원활하게 해주므로 골관절의 변성과정을 억제하고 회복시켜주는 골관절염 치료제입니다.

● **원료약품의 분량** : 1캡슐중

결정황산글루코사민(식품의약품안전고시 제98-127호) ····· 312.5mg
(황산글루코사민으로서 250mg)

● **성 상**

담황갈색의 가루 또는 과립상이든 상단 암녹색, 하단 백색의 캡슐

● **약리작용 및 특장점**

1. 글루사민캡슐은 관절연골의 병소를 치료하고 관절기능을 원활하게 합니다.
2. 글루사민캡슐은 관절연골의 정상적인 연골생성을 촉진시킵니다.
3. 글루사민캡슐은 NSAIDs 약물과 달리 골관절염의 원인 치료제로써 부작용이 거의 없는 안전한 약물입니다.

● **효능 · 효과**

다음 질환에 사용할 수 있습니다.
-골관절염(퇴행성 관절질환)

● **용법 · 용량**

성인 : 황산글루코사민으로서 1회 2캡슐, 1일 3회 식전에 6주간 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

● **사용상의 주의사항**

1. 다음 환자에는 투여하지 말것
   1)이 약에 과민증 환자
   2)결핵 환자
   3)임부, 수유부
   4)황에 불내성인 환자
2. 부작용
   이 약중에 황이 함유되어 있으므로 위통 등의 소화기질환 가능성이 있다.
3. 일반적 주의
   1)만성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
   (1)장기 투여하는 경우 정기적인 임상검사(요검사, 혈액검사, 간기능검사 등)를 하고 이상이 있을 경우 감량, 휴약 등의 적절한 조치를 한다.
   (2)약물요법 이외의 치료법도 고려한다.
   2)급성 질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
   (1)급성염증, 동통 및 발열의 정도를 고려하여 투여한다.
   (2)원칙적으로 동일한 약물의 장기투여는 피한다.
   3)다른 소염진통제와 병용은 피하는 것이 바람직하다.
   4)고령자 및 어린이에 있어서 필요한 최소량으로 신중히 투여하고 부작용의 발현에 특히 유의한다.

● **사용기간** : 제조일로부터 36개월

● **저장방법** : 기밀용기, 냉암소에 저장(15℃이하)

● **포장단위** : 300캡슐

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사 및 자사 학술부로 문의하시기 바랍니다.

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입한 병 · 의원, 약국 및 도매상을 통하여 교환하여 드립니다. (문의전화 : 02-798-9387, 학술부)


**경남제약주식회사**
서울시 용산구 한강로3가 40-876
충남 아산시 신창면 읍내리 80-24


마약없는 우리사회 건강가득 행복가득
약좋다고 남용말고 약모르고 오용말자

작성일자 2003.10.30