

상처, 부스럼, 화상에
세균성 피부감염증치료제

일반의약품
분류번호 611
KGMP
적격업체제품

후디킨[®] 연고

(푸시딘산나트륨)

후디킨[®]연고는 살균력이 강력하고 조직침투력이 우수한 항생제인 푸시딘산나트륨을 주 성분으로 하는 세균성 피부감염증 치료연고제입니다. **후디킨[®]연고**는 피부감염증의 주요 원인균인 황색포도상구균과 연쇄상구균을 낮은 농도에서 사멸시킴으로써 각종 피부감염 증에 치료효과를 나타냅니다. 또한 **후디킨[®]연고**의 주성분인 푸시딘산나트륨은 조직 친화력이 높은 스테로이드와 유사한 독특한 화학구조를 가지고 있어서 병소 부위에 고농도로 침투하므로 난치성·심재성 피부감염증에도 효과적일뿐 아니라, 파괴된 피부조직의 재생을 촉진시키는 작용을 나타내므로 상처, 부스럼, 화상 등의 피부감염증을 비롯하여 깊은 부위의 염증 및 화농성 질환에도 치료효과를 나타냅니다.

■ 원료약품의 분량 : 1g 중

푸시딘산나트륨(항기)..... 20mg(역가)

■ 성 상 : 흰색의 연고제

■ 효능 · 효과

1. 유효균종

포도구균, 연쇄구균, 코리네박테륨, 클로스트리듐

2. 적응증

농피증(농가진, 감염성습진양피부염, 심상성여드름(보통여드름), 모낭염, 종기 및 종기증, 화농성한선염, 농가진성습진), 화상 · 외상 · 봉합창 · 식피창에 의한 2차 감염

■ 용법 · 용량

환부를 깨끗이 하고 1일 1~2회 적당량을 환부에 직접 바르거나 무균거즈에 넓게 펴발라 붙인다. 두꺼운 층에는 적용을 피하며 보통 1주 정도로 투여기간을 제한한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 푸시딘산 및 그의 염에 과민반응의 병력이 있는 환자
- 2) 비감수성균(특히 녹농균)에 의한 감염환자

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

- 1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현 등을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료 상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직하다.
- 2) 감작될 수 있으므로 충분히 관찰하고 감작된 증후(가려움, 발적, 종창, 구진, 소수포 등)가 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
- 3) 이 약은 높은 투과흡수성을 가지므로 장기간 또는 광범위한 표면에 투여하지 않도록 주의한다.

- 4) 국소사용 시 내성균이 발현되면 추후 동일한 항생물질을 경구투여 시 해로울 수 있다. 그러나 대체로 내성균은 단시간내 다시 이 약에 대해 감수성을 갖게 된다.
- 5) 반복 투여 및 장기연용으로 인해 비감수성균이 과잉증식 할 수 있다. 만일 균교대증이 발생하면 이 약의 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 6) 안과용으로 사용하지 않는다.
- 7) 눈 또는 눈꺼풀과 같은 얼굴 안쪽에 사용하는 것은 적합하지 않다.
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 임부 및 임신 가능한 여성에게 투여 시 이 약은 전신투여 시 태반관문을 통과한다는 보고가 있으므로 국소사용 시 치료 상의 유의성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
 - 2) 수유부가 유방감염에 이 약을 사용할 경우 신생아에게 흡수될 수 있다.
 - 3) 수유부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않고 전신투여 시 유즙으로의 이행이 보고 되었으나 국소사용 시 상용량에서는 영아에 영향을 미치지 않는다.
 - 4) 미숙아 및 신생아는 간기능이 미숙하므로 장기간 또는 광범위한 표면에 투여할 경우에는 간기능 장애가 나타날 수 있으므로 주의한다.
4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.
: 일시적인 작열감 때때로 발진, 약한 동통 및 자극 등의 과민반응이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다. 또한 중증의 다리레양 환자에 적용시 통증이 유발될 수 있다.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 11g

※ 의사·약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2005년 1월)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)나 소비자 상담실(수신자부담 전화080-082-1234)를 통해 알 수 있습니다.

® = 등록상표
설명서 개정일 : 2006. 8
FDK-03-06-1171

제조판매원



삼진제약주식회사

본 사 : 서울특별시 마포구 서교동 338-8

공 장 : 경기도 화성시 향남면 상신리 904-2

☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031)353-1712/6