

코사민 캡슐

COSAMIN Cap.

코사민캡슐은 관절연골의 대사과정중에 기질로써 직접 작용하는 활성물질인 결정황산 글루코사민을 주성분으로 함유하는 제제로써, 관절의 연골세포를 구성하는 물질인 Proteoglycan의 생성을 자극하여 관절을 정상화시켜주고, 관절의 활액생성을 증가시키고 점도를 개선하여 윤활작용을 함으로써 관절기능을 원활하게 하여 관절의 변성과정을 억제하고 회복시켜 주는 관절염 치료제입니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐중

결정 황산글루코사민 (KPC) 312.5mg
(황산글루코사민으로서 250mg)

【성 상】 백색 내지 담황색의 가루 혹은 과립상이 든 상, 하부 무색의 경질캡슐

【약리작용 및 특징】

1. 코사민캡슐은 관절연골의 구성성분인 Proteoglycan의 생합성 과정을 자극하고, 기질로써 직접 작용합니다.
2. 코사민캡슐은 관절연골의 병소를 치료하고 관절기능을 원활하게 하여 줍니다.
3. 코사민캡슐은 Prostaglandin의 생합성 억제에 의하지 않고 항염작용을 나타냅니다.
4. 코사민캡슐은 NSAIDs약물과 달리 골관절염의 원인 치료제로써 부작용이 거의 없는 안전한 약물입니다.
5. 코사민캡슐은 타 약물과 상호작용이 거의 없으므로 필요시 타 약제와 병용 투여할 수 있습니다.

【효능·효과】 다음 질환에 사용할 수 있습니다. : 골관절염, 퇴행성 관절질환

【용법·용량】

성인 : 황산글루코사민으로서 1회 500mg을 1일 3회 식전에 6주간 경구투여하십시오.
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약에 과민증환자
- 2) 결핵환자
- 3) 임부, 수유부
- 4) 황에 불내성인 환자

2. 부작용

이 약중에 황이 함유되어 있으므로 위통등의 소화기질환의 가능성이 있습니다.

3. 일반적 주의

- 1) 만성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려할 것.
 - ① 장기 투여하는 경우 정기적인 임상검사(요검사, 혈액검사, 간기능검사 등)를 하고, 이상이 있을 경우 감량, 휴약 등의 적절한 조치를 할 것.
 - ② 약물요법 이외의 치료법도 고려할 것.
- 2) 급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려할 것.
 - ① 급성염증, 동통 및 발열의 정도를 고려하여 투여할 것.
 - ② 원칙적으로 동일한 약물의 장기 투여는 피할 것.
- 3) 다른 소염진통제와 병용은 피하는 것이 바람직합니다.
- 4) 고령자 및 어린이에 있어서 필요한 최소량으로 신중히 투여하고 부작용의 발현에 특히 유의하십시오.

【포장단위】 180캡슐

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

* 본 의약품은 우수약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 의약품을 구입하였을때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

* 이 첨부문서 작성일자(2007년 10월)이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(<http://www.youngilpharm.co.kr>)나 소비자상담실(02-522-7006)에서 확인할 수 있습니다.

* 제조판매원 : 영일제약(주) - 충북 진천군 진천읍 신정리 521-15

설명서개정년월 : 2007년 10월



영일제약(주)
www.youngilpharm.co.kr