



광학활성 비염·코감기 치료제 비비콜 플러스 정

Pbipbicol Plus Tabs.

일반의약품
분류번호 : 141

비비콜플러스정은 약효가 확실한 광학활성형 항히스타민제인 데스브로페니라민과 부작용이 적은 비충혈 제거제인 슈도에페드린을 배합한 비염 코감기 치료제로서 다른 제제에 비해 약효가 확실하고 안전합니다.

【성분·함량】 (1정 중)

말레인산데스브로페니라민(유.에스.피) 2mg
황산슈도에페드린(유.에스.피) 60mg

【성상】

하늘색의 장방형 정제

【특징】

- 비비콜플러스정은 항히스타민제와 비충혈 제거제가 함께 들어 콧물, 재채기, 코막힘 등 다양한 비염 증상을 치료해줍니다.
- 비비콜플러스정에 들어있는 광학활성형 항히스타민제인 데스브로페니라민은 생체이용률이 높아 적은 양으로 약효가 확실하고 부작용이 매우 적습니다.
- 비비콜플러스정에 들어 있는 비충혈 제거제인 슈도에페드린은 다른 약물에 비해 약효가 확실하고 부작용이 적어 비염·코막힘 등에 광범위하게 사용됩니다.

【효능·효과】

계절성 및 통년성 비 알레르기, 급성 비염 및 부비동염, 급성 및 아급성 부비강염, 이관폐쇄 및 부비강 중염에서의 상기도 점막 충혈의 증상 변화

【용법·용량】

성인 및 12세 이상의 소아 : 1회 1정씩 1일 3~4회 식후에 복용하십시오.
6세~12세 미만의 소아 : 1회 1/2정씩 1일 3~4회 식후에 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 금기환자

- 선행하는 2주에서 MAO 억제약물을 복용한 환자 혹은 복용중인 환자
- 혈압상승 효과가 있는 아민 혹은 항히스타민제에 대해 과민반응이 알려져 있는 환자

2. 주의사항

- 슈도에페드린은 정상혈압을 나타내는 사람에게는 실제로 어떠한 혈압상승효과도 유발하지 않으나, 노인환자와 고혈압, 만성폐질환, 당뇨병, 잠복성 혹은 임상적으로 인식되는 폐쇄각 녹내장, 관상동맥질환, 울혈성심부전, 요폐, 전립선비대증 및 갑상선기능항진증을 지니고 있는 환자에 대해서는 신중히 투여하여야 합니다.

2) 데스브로페니라민은 졸음을 유발하여, 민첩성을 요하는 업무수행 혹은 운전능력에 손상을 일으킬 수 있습니다.

3) 항히스타민제의 억제효과는 중추신경계에 영향을 나타내는 다른 약물과의 병용투여시 부가적으로 나타날 수 있으므로 항히스타민제 치료요법을 실시하고 있는 동안, 알코올성 음료를 음용하거나 수면제, 진정제, 정신치료약물 혹은 중추신경계 억제 효과가 있는 기타 약물을 복용하고 있는 환자에 대해 주의가 요구됩니다.

3. 임부 및 수유부에 대한 투여

임신 및 수유기간 동안 이 약의 안전한 사용에 대해서는 아직 명확히 수립되지 않았으므로 투여 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

4. 부작용

- 때때로 경증의 졸음 및 피부발진이 나타날 수 있습니다.
- 불안, 긴장, 안절부절증, 신경과민증, 진전, 허약, 불면증, 두통, 심계항진, 빈맥, 협심증, 혈압 상승, 발한, 동공산대, 식욕부진, 오심, 구토, 현기증, 변비 및 방광괄약근 경련으로 인한 배뇨 곤란이 나타날 수 있습니다.

5. 저장상의 주의사항

- 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는대로 습기가 적고 서늘한 곳에 밀봉하여 보관하십시오.
- 오용을 막고 품질의 보존을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 3년

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국등의 개설자에 한하여 당사 담당 영업사원을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인 할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

코스닥상장
 신일제약(주)



분리배출

설명서 개정년월일: 2001.6.15