

말초순환장애 및 근육경련개선제



【원료약품 및 분량】

초산토코페롤(K,P).....500mg

(비타민E로서 500IU)

산화마그네슘(K,P).....250mg

(마그네슘으로서 150.8mg)

【성 상】 미황색의 점조성액을 내용물로 하는 적갈색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

-노년기의 비타민E의 보급

말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨,목결림, 수족저림, 수족냉증

-마그네슘결핍으로 인한 근육경련

【용법·용량】

18세 이상 어린이 및 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐을 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자

2) 12개월 미만의 영아

3) 중증의 신부전 환자

4) 임부

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오(복용 전 의사 또는 약사와 상의할 것.)

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 임부, 수유부

3) 심장,순환기계기능 장애 환자

4) 신장에 환자

5) 저단백혈증 환자

3. 부작용

1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

:위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적

2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도있다.

3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.

4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있다.

4.일반적 주의

1) 정해진 용법,용량을 잘 지킨다.

2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.

5.상호작용

1) 항알도스테론제,트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의한다.

2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다.

-인산염, 칼슘염,경구용테트라사이클릭제 제제, 제산제

3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피할 것.

6.저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는곳에 보관한다.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 본 제품은 우수 의약품 제조관리 및 품질 관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만일 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환해 드립니다.

BISC 2007-02



PHARVIS (주)한국파비스
KOREA

경기도 안산시 단원구 복내동 456-3
소비자상담실 031) 491-7178

