

실로브이 정

Cilo V^{Tab.}

(실로스타졸)

[원료약품의분량] 이 약 1정 중

주성분: 실로스타졸 (별규) 100 mg

[상징] 흰색의 원형 정제

[효능·효과]

- 만성동맥폐색증 (버거씨병, 폐색성 동맥경화증, 당뇨병성 말초혈관병증 등) 에 따른 궤양, 동통 및 냉감 등 허혈성 제증상의 개선
- 뇌경색 (심인성뇌색전증제외발증 후 재발 억제

[용법·용량]

실로스타졸로서 보통 성인 1회 100mg을 1일 2회 경구투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

- 경고**

이 약의 투여에 의해 맥박수가 증가하여 협심증이 발현하는 경우가 있으므로 협심증의 증상(흉통 등)에 대한 문진을 주의 깊게 실시한다(뇌경색 재발 억제효과를 검토하는 시험에서, 장기간에 걸쳐 PRP(pressure rate product)를 의미 있게 상승시키는 작용이 인정되었다. 또한, 이 약 투여군에서 협심증이 발현된 증례가 나타났다).

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 출혈혈우병, 모세혈관 취약증, 두개내출혈, 상부소화관출혈, 요로출혈, 객혈, 초저출혈 등) 또는 그러한 소인(혈동성 소화궤양, 최근 6개월 이내에 출혈성뇌출중, 3개월 이내에 외과수술, 증식성당암방복증, 조절되지 않는 고혈압이 있는 환자(출혈을 조정할 우려가 있다)
- 울혈성심부전 환자(증상을 악화시킬 우려가 있다)
- 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 환자
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부(임부 및 수유부에 대한 투여' 항 참조)

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 항응고제(와파린 등), 항혈소판제(아스피린, 티클로피딘 등), 혈전용해제(우로키나제, 알테플라제 등), 프로스타글린딘 E 제제 및 그 유도체(알프로스타딜, 리마프로스트 알파맥스 등)를 투여중인 환자
- 월경기간 중인 환자(출혈을 조정할 우려가 있다)
- 관동맥 협착의 합병증 환자(이 약의 투여에 의한 맥박수 증가로 협심증을 유발할 가능성이 있다)
- 중증 심부전 환자(크레아티닌 청소율 < 25mL/분)이 약의 대사의 혈중농도가 상승될 수 있다X '기타' 항 참조)
- 중등도 또는 중증 간부전 환자(이 약의 혈중농도가 상승될 수 있다X '기타' 항 참조)
- 당뇨병 또는 내당능 장애가 있는 환자(혈혈성 유해증상이 발현하기 쉽다)
- 지속적으로 혈압이 상승하고 있는 고혈압 환자(약성고혈압 등)
- 신방이나 심실전위 환자, 심방세동이나 조동 환자, 심실빈맥, 심실세동 또는 다초점성심실이상성박동 환자, QT간격의 연장이 있는 환자

4. 이상반응

1) 중대한 이상반응

- 출혈경향 : 뇌출혈 등의 두개내출혈(초기증상 : 두통, 구역·구토, 의식장애, 반신불수 등), 폐출혈, 때때로 피하출혈, 드물게 소화관출혈, 비출혈, 안저출혈, 혈뇨 등의 출혈경향이 나타날 수 있다. 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 혈액계 : 범혈구감소증, 무과립구증, 드물게 혈소판감소증, 백혈구감소증, 재생불량성빈혈이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우 에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 간질성 폐렴 : 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부쓰신 이상, 호산구증가를 동반한 간질성 폐렴이 나타날 수 있다. 이러한 경우에는 투여를 중지하고 부신피질호르몬제의 투여 등 적절한 처치를 한다.
- 울혈성심부전, 심근경색, 협심증, 심실빈맥 등이 나타날 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 황달, 때때로 AST, ALT, ALP, LDH 등의 상승이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

- 기타의 이상반응
 - 과민반응 : 광과민반응, 때때로 발진, 드물게 파진, 두드러기, 가려움증이 나타날 수 있다. 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
 - 전신 : 등통증, 감염, 오한, 불쾌감, 경부강직, 골반통, 복막위출혈이 나타날 수 있다.
 - 순환기계 : 심방세동, 심방조동, 상실성 빈맥, 심실위 빈맥, 상실성 기외수축, 심실성 기외수축 등의 부정맥, 혈압저하, 체위성저혈압, 때때로 심계항진, 빈맥, 환갑거림, 드물게 혈압상승이 나타날 수 있다. 이러한 경우에는 감량 또는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다. 인과관계는 밝혀지지 않았으나 임상 시험에서 뇌경색, 대뇌허혈, 심장지, 심근허혈, 실신, 정맥류, 혈관확장이 보고되었다.
 - 정신신경계 : 불안, 신경통, 무력증, 이상한 꿈, 때때로 두통· 두중감, 어지러움, 불면, 자린감, 드물게 졸음, 진전이 나타날 수 있다. 이러한 경우에는 감량 또는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 소화기계 : 대변이상, 소화불량, 담석증, 대장염, 십이지장궤양, 십이지장염, 식도염, γ -GTP의 상승, 위염, 위장염, 잇몸출혈, 흑색변, 소화장애, 치주농양, 위궤양, 허부증, 때때로 복통, 구역·구토, 식욕부진, 설사, 속쓰림, 복부팽만감이 나타날 수 있다.
 - 혈액 및 림프계 : 적혈구중가증, 자색반병, 출혈시간증가, 고혈소판증, 호산구증가, 드물게 빈혈이 나타날 수 있다.
 - 대사 및 영양계 : 안면부종, 말초부종, 통풍, 고지혈혈증, 드물게 혈당상승이 나타날 수 있다.
 - 근골격계 : 근육통, 관절통, 골통, 윤활낭염이 나타날 수 있다.
 - 호흡기계 : 기침증가, 인두염, 비염, 천식, 부비동염, 폐렴이 나타날 수 있다.
 - 내분비계 : 당뇨병이 나타날 수 있다.
 - 피부 및 부속기계 : 건조한 피부, 증가, 피부비대가 나타날 수 있다.
 - 감각기계 : 약시, 실명, 복시, 귀통증, 드물게 이명, 결막염이 나타날 수 있다.
 - 비뇨생식기계 : 단백뇨증, 방광염, 질출혈, 질염, 드물게 빈뇨가 나타날 수 있다.
 - 신장 : 심부전, 신기능이상, 드물게 BUN, 크레아티닌, 요산의 상승이 나타날 수 있다.
 - 기타 : 때때로 발한, 부종, 흉통, 드물게 동통, 견관절, 발열이 나타날 수 있다.

3) 국내재상시결과

국내에서 시판후 조사기간 동안 650례를 대상으로 실시한 안전성 평가 결과 이상반응의 발현율은 인과관계 여부와 상관없이 34례에서 382(5.24%)로 보고되었다. 이 중 약물과의 인과관계를 배제할 수 없는 이상반응 발현율은 29례에서 332(4.47%)으로 다음과 같다.
가. 중증 및 말초신경계 이상 : 두통 2.77%(18례/650례), 불안(흥분) 0.15%(1례/650례)

나. 위장관계 이상 : 설사 0.46%(3례/650례), 구역(0.31%(2례/650례), 소화불량증 0.15%(1례/650례), 구토 0.15%(1례/650례), 식욕부진 0.15%(1례/650례), 복통 0.15%(1례/650례)
다. 피부 및 부속기관 이상 : 소양감 0.15%(1례/650례), 발진 0.15%(1례/650례)
라. 정신신경계 이상 : 경면 0.15%(1례/650례)
마. 심박 이상 : 심계항진 0.15%(1례/650례)
이 중 현재 허가사항에 기재되어 있지 않은 예상하지 못한 새로운 이상반응으로 약물과의 인과관계 여부와 상관없이 골격이상, 객담증가 각 0.15%(1/649명, 1건)이었으며, 중대한 이상반응은 인과관계 여부와 상관없이 구토, 골격이상, 출혈이 각각 0.15%(1/649명, 1건)이었다.

5. 일반적 주의

- 이 약의 뇌경색 환자에 대한 투여는 뇌경색의 증상이 안정된 후에 시작한다.
- 뇌경색 환자에 대한 투여시 다른 항혈소판제 등과의 상호작용에 주의함과 동시에 고혈압이 지속되는 환자에 대한 투여도 신중히 해야 하며, 투여중에는 혈압을 충분히 조절해야 한다.
- 관동맥 협착의 합병증이 있는 환자에서 이 약 투여중 과도한 맥박수 증가가 나타났을 경우에는 협심증을 유발할 가능성이 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
- 환자에게 출혈과 가벼운 타박상, 발열, 인후염과 같은 혈액질환의 조기발현을 의미하는 어떠한 징후도 신속히 보고하도록 주지시켜야 한다. 감염이 의심되거나 혈액질환의 임상적 징후가 있으면 전혈구수를 측정해야 한다. 혈액학적 이상의 임상 또는 실험실적 징후가 있으면 이 약의 투여는 즉시 중단되어야 한다.
- 이 약은 어지러움을 일으킬 수 있으므로 운전이나 기계조작 전에 주의하도록 주지시켜야 한다.

6. 상호작용

- 이 약은 주로 간 대사효소인 CYP3A4 및 일부 CYP2D6, CYP2C19에 의해 대사된다.
- 항응고제(와파린 등), 항혈소판제(아스피린, 티클로피딘 등), 혈전용해제(우로키나제, 알테플라제 등), 프로스타글린딘 E, 제제 및 그 유도체(알프로스타딜, 리마프로스트, 알파맥스 등)는 출혈을 조정할 우려가 있으므로 혈액응고능 검사 등을 충분히 실시하면서 사용한다.
- CYP3A4저해제나 CYP2C19저해제(메티딘, 딜티아제, 에리스로마이신, 케토코나졸, 란소프라졸, 이트라코나졸, 미코나졸, 오메프라졸, HIV-1 단백분해효소 저해제 등)와의 병용에 의해 이 약의 혈중 농도가 상승하여 작용이 증가할 우려가 있다. 병용하는 경우에는 감량, 또는 저용량부터 시작하는 등 주의해야 하며, 또한 저용주수와 동시 복용하지 않도록 주의한다.
- CYP3A4나 CYP2C19의 기질이 되는 약물(시사프리드, 미다졸람)과의 병용에 의해 이 약의 혈중 농도가 상승하여 작용이 증가할 우려가 있다. 병용하는 경우에는 감량 또는 저용량부터 시작하는 등 주의해야 한다.
- 이 약은 반사빈맥으로 추가적인 저혈압효과 있을 가능성이 있기 때문에 혈압을 저하시키는 정제상이 있는 약물 또는 디하이드로피리딘계 칼슘채널차단제와 같이 반사빈맥을 일으키는 혈관확장제와의 병용할 때 주의가 필요하다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 동물실험(랫트)에서 임신상태의 증가 및 출생시의 저체중, 사망의 증가가 보고되었으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 투여하지 않는다.
- 동물실험(랫트)에서 유증증으로의 이행이 보고되었으므로 투여 중에는 수유를 중단한다.

8. 소아에 대한 투여

저체중출생아, 신생아, 영·유아, 또는 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).

9. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

10. 과량투여시의 처치

사람에게 있어 이 약의 급성 과량투여에 대한 정보는 제한적이다. 급성 과량투여의 증상과 징후는 중증 두통, 설사, 저혈압, 빈맥, 또는 심부정맥으로 예상된다. 환자를 주의깊게 살펴보고 지지 및 보조적인 치료를 행한다. 이 약이 높은 단백질결합을 하기 때문에 혈액투석이나 복막투석으로 효과적인 제거가 어려울 것이다. 적절한 구토나 위세척으로 위를 비워야 한다. 이 약의 경구 LD50은 마우스와 랫트에서 5.0g/kg, 개에서 2.0g/kg 이다.

11. 기타

- 이 약은 PDE Ⅲ 저해작용을 가지는 약물이다. 외국에서는 PDE Ⅲ 저해작용을 가지는 강심제에 대해 울혈성심부전(NYHA 분류 Ⅲ~Ⅳ)환자를 대상으로 한 위약대조 장기/투여비교시험에서, PDE Ⅲ 저해작용을 가지는 강심제에서의 생존율이 위약에 비하여 높았다는 보고가 있다. 또한, 울혈성심부전을 나타내지 않는 환자에 있어, 이 약을 포함한 PDE Ⅲ 저해제를 장기투여한 경우의 예측은 분명하지 않다.
- 비글을 이용한 13주 및 52주 반복경구투여독성시험에서, 고용량의 경우 좌심실심내막의 비후, 관상동맥의 장애가 인정되었으며, 무독성량은 각각 30mg/kg/day, 12mg/kg/day 였으나 이러한 변화는 갯트 및 원숭이에서는 인정되지 않았다. 비글의 경우 1주간 정맥투여한 심장독성시험에서 좌심실심내막, 우심방심외막 및 관상동맥의 변화가 나타났으며, 원숭이의 경우 경증 좌심실심내막의 출혈성 변화가 인정되었다. 다른 PDE 저해제와 혈관확장제의 경우에도 동물에 대한 심장독성이 인정되었으며, 특히 개에서 독성발현이 쉽게 나타난다는 보고가 있다.
- 유전적으로 현저하게 높은 혈압이 지속되어 뇌출혈이 발병되는 SHR-SP(뇌출증이 발증하기 쉬운 고혈압자면발증 랫트, stroke-prone spontaneously hypertensive rats)에서, 이 약 0.3% 혼합식이균은 대조군과 비교해 생존기간의 단축이 인정되었다(평균수명 : 이 약군 402주, 대조군 435주).
- 뇌경색 재발억제 효과를 검토하는 시험에서 위약군에 비해 이 약군에서 당뇨병의 발증에 및 약화제가 많이 나타났다(이 약군 11/520례, 위약대조군1/523례).
- 이 약 100mg과 HMG-CoA 환원효소 저해약 로바스타틴 80mg을 병용투여시, 로바스타틴 단독투여에 비해 로바스타틴의 AUC 가 64% 증가했다는 해의 보고가 있다.
- 무중추성 뇌경색에 대하여 이 약의 뇌경색 발작억제효과에 대한 시험은 실시된바 없다.
- 음식물과 함께 이 약을 복용하면 이 약의 혈중농도가 상승하여 이상반응 발생율이 증가될 수 있으므로 필요시 적절한 감량한다. 특히, 고지방식에서 이 약의 흡수가 증가하여 Cmax는 90%, AUC는 25%의 상승을 보였으므로 고지방식을 섭취하는 환자의 경우에는 특히 주의한다.
- 신기장 장애 환자(체내동태 : 중증 신장애 환자에게 1일 100mg을 8일간 연속해서 경구투여 시, 건강한 성인에 비해 이 약의 Cmax는 29%, AUC는 39% 감소 하였으나, 혈청대사체의 Cmax는 173%, AUC는 209% 증가하였다. 경증 및 중등도 환자에서는 유의적인 차이가 없었다.
- 간기능 장애 환자(체내동태 : 경증 간장애 환자에게 100mg을 단회 경구투여 시, 혈중농도가 건강한 성인과의 차이를 보이지 않았대Cmax는 7% 감소, AUC는 8% 증가).
- 케토코나졸, 에리스로마이신, 오메프라졸 : CYP3A4 저해제인 케토코나졸 400mg과 병용투여시 Cmax는 94%, AUC는 117% 증가하였고, 에리스로마이신 500mg과 병용투여시 Cmax는 47%, AUC는 73% 증가되었다. CYP2C19 저해제인 오메프라졸과 병용투여시 대사제인 3,4-dihydro-dlosazole이 69% 증가하였다는 환자에는 투여하지 말 것

[포장단위] 30정, 100정

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

[사용기간] 제조일로부터 36개월

※ 본 약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 유통 중 사용기간이 경과하였거나, 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국이나 보사 영업부에서 교환하여 드립니다.
※ 첨부문서 내용변경에 대한 자세한 사항은 온라인약도서관(http://drug.mfds.go.kr)을 참조하시기 바랍니다.

* 본 제품은 정부에서 고시한 소비자 피해 보상규정에 의거 정당한 소비자의 피해에 대해 보상해 드립니다.
전화번호(대표) 02-317-2114 고객상담실 : 080-022-1400

판매원

한국화이자제약



제조사



LG생명과학

혁신헬양구오음양평로151

※ 첨부문서 최종 개정연월일 : 2015. 02. 25
OPM205531-3