



임신·수유부를 위한 빈혈치료제

훼로진 에프 정

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어보시고, 사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

【개발경위·개요 및 특징】

철결핍성 빈혈은 가장 흔한 형태의 빈혈로서 철의 섭취부족 및 흡수장애, 만성출혈, 임신과 수유기간 중 철의 요구량 증가 등에 의하여 발생합니다. 빈혈은 특별한 증상의 자각없이 오랜기간에 걸쳐서 서서히 진행되며, 이미 발현된 철결핍성 빈혈에는 반드시 철분제제를 복용하여야 합니다. 훼로진 에프정은 수산화제이철폴리말토스복염과 엽산을 주성분으로 하는 철분제제로써, 흡수율을 높이고 위장관부담, 치아변색, 흡수저하 등의 부작용은 현저하게 줄여서 임신부 및 생리중인 여성들이 편리하게 복용할 수 있는 빈혈치료제입니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

수산화제이철폴리말토스복염 (식품의약품청고시)[철(III)로서 100mg] 357mg
엽산 (약전) 350μg

【성상】 적갈색의 원형정제입니다.

【약리작용】

1. 높은 이용률, 낮은 부작용

훼로진 에프정은 위장관에서 수산화제이철폴리말토스복염 형태 그대로 흡수되는 비이온형 제제이므로 소화기 장애 등 부작용이 적고 생체 이용률이 매우 높습니다.

2. 엽산(Folic acid) 첨가

임신시 다량 필요한 비타민 성분인 엽산이 철분성분과 함께 첨가되어 있어 임신시 빈혈의 예방 및 치료에 효과적입니다.

3. 편리한 복용법

훼로진 에프정은 하루 1번 복용으로 매우 간편하고 초콜렛 맛으로 물없이도 복용할 수 있어서 편리합니다.

【효능·효과】 철 결핍성 빈혈

【용법·용량】 성인: 1일 1회 1정을 식후 씹거나 삼켜서 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하십시오. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락하십시오.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응 환자
- 2) 12개월 미만의 영아
- 3) 혈색소증 (철대사 이상으로 철이 간장, 췌장에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증 환자
- 4) 철 이용 장애 환자 (예: 납 중독으로 인한 빈혈, 철불용성 빈혈, 지중해 빈혈)
- 5) 비철결핍성 빈혈 (예: 비타민 B₁₂ 결핍으로 인한 거대적아구성 빈혈) 환자
- 6) 철분과잉증 환자 (만성용혈 현상)
- 7) 감염이나 종양으로 인한 철결핍성 빈혈 환자 (철이 세망내피계에 축적되어 이용에 장애를 받을 수 있으므로 1차 질환이 치료된 후 복용하십시오)

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염
- 2) 경구용 테트라사이클린계 제제
- 3) 제산제

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장에 환자
- 5) 저단백혈증 환자
- 6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 함께 복용하는 사람 (고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오)

5. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차 및 우유·유제품은 복용중, 복용 전후에는 피하십시오.

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 두드러기, 가려움, 햇빛 노출시 피부 과민반응
- 2) 복부·위통증, 위 경련, 위부불쾌감
- 3) 구역, 구토, 식욕부진, 변비, 설사
- 4) 열, 혼수
- 5) 대량투여로 인한 구역, 구토 등의 위장 증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 3) 빈혈은 항상 의사의 지시 하에 치료를 받아야 합니다. 치료 성과 (헤모글로빈이 약 0.1 g/dL blood/day 증가 및 3주 후 2 ~ 3 g/dL blood/day 증가) 가 나타나지 않을 경우, 재 치료를 고려해야 합니다. 반복적으로 수혈을 받는 환자인 경우, 적혈구와 함께 철도 유입됨으로써 철 과잉증이 나타날 수도 있으므로 주의하십시오.
- 4) 아스코르빈산 (비타민 C) 200 mg 이상과 함께 복용하는 경우 철분의 흡수가 증가될 수 있습니다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 3) 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 30정

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우

구입하신 병·의원, 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자 (2006년 11월 3일) 이후 변경된 내용은

홈페이지 (www.greencross.com) 나 소비자상담실 (080-260-0033) 로

문의하시기 바랍니다.

※ 포장 개봉방법 및 유의사항



어린이들이 쉽게 개봉하기 어려운 어린이 보호용 마개 (CRC=Child-Resistant Closure)를 사용하여 어린이 약물중독을 예방하고 있습니다.
【사용법】 1. 뚜껑을 누른 상태에서
2. 시계 반대방향으로 돌려주세요.

제조판매원



주식
회사 녹십자

충북 음성군 금왕읍 내송리 156-50 TEL 031)260-9300
소비자 상담실 TEL 080-260-0033

설명-10-1006-1