

[성분 · 함량] 1포종

항소산엑스(별규)	128.6mg
향부자(약전)	272mg
진피(약전)	204mg
자소엽(약전)	136mg
감초(약전)	68mg
건강(약전)	68mg
아세트아미노펜(약전)	210.0mg
에텐자미드(약전)	150.0mg
dL-메칠에페드린염산염(약전)	12.5mg
클로르페니라민말레산염(약전)	2.5mg
덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(약전)	15.0mg
카페인(약전)	30.0mg
첨가제(동물유래) : 유당수화물(네덜란드산 소, 우유)	

[성 상] 갈색의 과립제

[효능 · 효과]

감기의 제증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법 · 용량]

15세 이상의 성인 1회 1포 1일 3회 식후 30분에 복용하십시오
어린이 1회
11세 이상 ~ 15세 미만 : 2/3포
7세 이상 ~ 11세 미만 : 1/2포
3세 이상 ~ 7세 미만 : 1/3포
2세 이상 ~ 3세 미만 : 1/4포

[사용상의 주의사항]

- 경고
 - 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상 및 위장출혈이 유발될 수 있습니다.
 - 이 약에 함유되어 있는 인공감미(단맛)제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 마십시오.
- 다음 사람은 복용하지 마십시오.
 - 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적(총혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람
 - 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.
- 다음 사람은 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예를 들면 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영·유아 및 14세 이하의 어린이
 - 간장, 신장, 감상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
 - 심장에 장애가 있는 사람 또는 고령자
 - 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
 - 부종(부기)이 있는 환자
 - 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 환자
- 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오.
 - 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
 - 다음 약물과는 동시에 복용하지 마십시오.
진해거담약(가래약), 다른 감기약, 해열진통약, 항히스타민제, 진정제 등

- 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 · 감독 하에 복용시키십시오.
- 2세 미만의 영 · 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 하십시오. 2세 미만의 영 · 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 이 약의 복용에 의해 노량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사에게 상담하십시오.
 - 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기 연용(계속 복용(사용))할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 쌓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(열청 갑툼치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지하십시오.
 - 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지하십시오.
- 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의하십시오.
 - 복용하는 동안 발진, 발적(총혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
 - 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수축이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
 - 고열을 수반하며 발진, 발적(총혈되어 붉어짐), 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
 - 천식이 나타난 경우
 - 바르비탈계 약물, 삼한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있습니다.
 - 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로 신중히 투여하십시오.
 - 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전조작을 피하십시오.
 - 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 장기간 계속하여 투여하지 마십시오.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관하십시오.

[저장 방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장 단위] 자사포장단위

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다. 본 제품은 재정경제부 소비자피해보상규정에 의거 보상 받으실 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 삼익제약 홈페이지(www.samik.co.kr) 또는 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 의약품 정보를 참조하세요. 100325