일반의약품

철결핍성 빈혈치료제

분류번호 : 322

알부론정

알부론정은 1일 1회로 복용이 간편하며, 종래의 철분제제가 지닌 위장관장애, 치아변색, 금속성 맛, 음식물과 함께 복용시 흡수저하 등의 단점을 극복하여 임산부나 어린이들에게도 안심하고 사용할 수 있는 안전한 빈혈치료제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

수산화제이철폴리말토스복염 (식약청고시) 357mg
(3가철로서 100mg)
엽산 (약전) 0.35mg

【성상】 갈색의 원형 정제

【약리작용 · 특장】

1. 알부론 1정에는 철분으로서 100mg, 조혈에 필수적인 비타민인 엽산이 350㎍ 함유되어 1일 1회 1정 복용만으로 필요한 철분 및 엽산을 공급합니다.
2. 알부론의 주성분인 수산화제이철폴리말토스복염은 위장관에서 미변화상태로 신속히 흡수된 뒤, 간, 비장, 골수 등 조혈조직으로 수송되어 직접 헤모글로빈의 생합성에 이용되며, 또한 종래의 철분제제와 달리 활성형 철이 신장으로 배설되지 않으므로 생체내 이용률이 매우 높습니다.
3. 알부론은 화학적으로 안정되며 위장관에서 흡수된 후 망상계 세포내에서 철이온을 서서히 유리하는 비이온형 제제로 소화기장애 등 부작용이 거의 없으며 독성 또한 매우 낮습니다.
4. 알부론은 독특한 맛과 향을 지닌 정제로 물없이 씹어먹기에도 좋아 복용이 더욱 편리하며, 임산부 및 어린이의 빈혈치료제로 적합합니다.
5. 알부론은 1일 1회 요법의 빈혈치료제가 나타내기 쉬운 철분의 급성 독성을 감소시킴으로서 과용량에 의한 철독성을 해소하였습니다.
6. 알부론은 빈혈에 의한 제반증상을 소실시키며 1개월 정도의 추가복용에 의해 근육철(myoglobin) 및 저장철의 공급에 활용됩니다.

【효능 · 효과】

철결핍성 빈혈의 예방 및 치료

【용법 · 용량】

성인 및 12세 이상 어린이 : 1회 1정, 1일 1회 식후 삼키거나 씹어서 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1.경고

1)철 함유제제는 6세이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하십시오. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락 하십시오.

2. 다음 사람은 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
   1) 소화성 궤양, 만성 궤양성 대장염, 국한성 대장염 등의 위장질환이 있는 환자.
   2) 1세미만의 유아.
   3) 의사의 치료를 받고 있는 사람.
3. 복용시에는 다음 사항에 주의하십시오.
   1) 정해진 용법 용량을 지키십시오.
   2) 소아에 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오.
4. 복용 중 또는 복용 후 다음 사항에 주의하십시오.
   1) 이 약의 복용에 의해 구역, 구토, 식욕부진, 복통, 설사, 변비, 위부불쾌감 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
   2) 이 약의 복용에 의해 두드러기, 가려움증, 광선과민증 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
   3) 테트라사이클린계 항생제, 제산제와는 동시에 복용하지 마십시오.
   4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에 피하십시오.
   5) 일정기간 복용하여도 증상이 개선되지 않으면 의사 또는 약사와 상의하십시오.
5. 보관상의 주의
   1) 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
   2) 직사일광을 피하고 될 수 있는대로 (습기가 적고) 서늘한 곳에 (밀전하여) 보관하십시오.
   3) 오용을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1-30℃)

【포장단위】

10, 30, 60, 100, 120정

00427
010924
P32203-03

제조 · 판매원
한림제약주식회사
공장 : 경 기 도 용인시 유방동 1007
http://www.hanlim.com

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 사용(유효)기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※제품문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 전화해 주십시오. TEL : (02)3489-6114~5