

덴트그린캡슐

일반의약품

의약품 분류번호	231 치과구강용약
-------------	---------------

덴트그린캡슐은 치은염, 치조농루에 의한 잇몸발적, 부기, 출혈 및 고름을 완화시켜주는 치과구강용약으로 궤양·구취완화작용 및 염증완화작용이 있는 것으로 알려진 동클로로필린나트륨, 염화리소짐을 함유하며 또한 말초혈류촉진작용 및 조직세포의 결합력 증가작용이 있는 것으로 알려진 초산토코페롤, 아스코르빈산을 함유하여 잇몸질환에 따른 제증상을 효과적으로 완화시킵니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

동클로로필린나트륨(식약청고시 제98-127호) 20mg
염화리소짐(식약청고시 제98-127호) 30mg(역가)
제피아스코르빈산Type S.C(별규) 156.25mg
(아스코르빈산으로서 150mg)
건조비타민E 50% Type S.D(별규) 60mg
(초산토코페롤로서 30I.U)

【성상】 녹색 분말이 든 상, 하 녹색의 경질캡슐제

【효능·효과】

치은염·치조농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적, 부기, 출혈, 고름 등)의 완화

치은염·치조농루

- 치은염은 잇몸의 염증성 질환을 의미합니다. 일반적으로 잇몸표면에 출혈·발적(發赤)·종창(腫脹) 등이 나타나며, 치주염으로 발전하게 됩니다.
- 치조농루는 잇몸 안쪽 치주조직(치조골·치근막 등)이 파괴되는 상태를 말합니다.
치아의 표면과 잇몸에 생긴 틈은 치주염의 원인이 되는 세균증식에 매우 적합한 환경을 이루게 되어 치석이 형성되고 병의 진행을 돕게 됩니다. 그리하여 치주조직이 파괴되어 치아가 흔들리거나 치아의 이동이 일어나게 되고, 최종적으로 치아가 빠질 수 있습니다.

【용법·용량】

성인: 1회 1캡슐, 1일 3회, 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여할것

- 1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 환자
- 2) 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 3) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자

2. 부작용

- 1) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의한다.
- 2) 피부: 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진·발적, 화상양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의한다. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.

3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 1개월 이상 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의한다.
- 3) 이 약은 14세 이하의 소아에게 투여하지 않는다.

4. 저장상의 주의 사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고, 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위해서 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법 및 사용기간】

차광기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

【포장단위】

120, 240캡슐

【제품문의처】

080-424-7999

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 재정경제부 고시에 의거 보상받을 수 있습니다.(만약, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

※ 주의

1. 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관 할 것.
2. 충분한 양의 물과 함께 복용할 것.
3. 직사광선(또는 열)에 약하므로 과도한 햇빛노출이나 고온보관은 삼가 할 것.
4. 포장을 개봉하여 복용시 가끔 캡슐에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용시 캡슐에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용 할 것.

제품 개봉시 또는 취급시 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의 할 것

설명서 개정연월 : 2006. 06

제조원

판매원

Hanmi 한미약품(주)

Hanmi 한미FT(주)

경기도 화성시 팔탄면 하저리 893-5

서울특별시 송파구 방이동 48-9

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 제품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월 이후 변경된 내용은 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

31305969