| 일 반 의 약 품 |
| --- |
| 314 : 비타민 C 및 P제 |

SHIN POONG

고단위 비타민 C

# 비타레몬씨정 1000mg

아스코르브산

**비타레몬씨정**은 항산화 작용을 나타내는 아스코르브산(Vitamin C)이 1000mg 함유된 고단위 비타민C 제제입니다. 비타민C는 각종 질병에 대한 저항력을 증가시켜주고, 스트레스·노화로부터 인체를 보호할 뿐만 아니라 피로회복에도 도움을 줍니다. 또한 멜라닌색소 생성을 억제하여 피부색소의 이상침착을 방지하므로 기미·주근깨의 예방 및 치료에도 효과적입니다.

**【성분·함량】** 1정 중
아스코르브산 97% 과립(별규)·····1,030mg
(아스코르브산으로서 1,000mg)

**【성상】** 백색의 장방형 정제

**【효능·효과】**
1. 주효능·효과
   1) 비타민C 결핍증의 예방 및 치료(괴혈병 등)
   2) 비타민C의 요구량이 증가하는 각종 질환(소모성질환, 임산부, 수유부, 흡수불량증, 수술후, 심한 육체노동시 등)
2. 다음 질환에도 사용할 수 있습니다.
   다음 질환 중 비타민C 결핍 또는 대사장애가 관여된다고 추정되는 경우 : 골성장애, 골절시 골기질 형성, 자극성 과민증(광선과민성 피부염), 모세혈관의 파열로 인한 비출혈, 치육출혈, 골막하의 출혈, 혈뇨, 피부출혈, 정상출혈, 모발소포성과 각화증, 약물투여로 인한 비타민C 결핍증(살리실산염, 아트로핀, 염화암모늄, 바르비투르산염), 기미, 주근깨, 염증후의 색소침착

**【용법·용량】**
아스코르브산으로서 보통 성인 1일 500~1000밀리그람을 1회 또는 수회 분할 경구 투여합니다. 단, 연령 증상에 따라 적절히 증감합니다.

**【사용상의 주의사항】**
1. 부작용
   1) 아스코르브산 과량투여로 인하여 신장결석, 뇨의 산성화, 수산염결석의 침전을 일으킬 수 있습니다.
   2) 구역, 구토, 설사 등의 위장장해가 나타날 수 있습니다.
2. 일반적 주의
   통풍환자 및 시스틴뇨증 환자에게 사용을 피하십시오.
3. 기타
   각종 뇨당검사에서 뇨당의 검출을 방해할 수 있습니다.

**【저장방법】** 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

**【포장단위】** 90, 180 정

※ 유통도중 사용기한이 경과되었거나, 변질·변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

3-218
설명서 작성년월일 20021015

민족의 슬기와 긍지로 인류의 건강을 위하여
신풍제약주식회사
경기도 안산시 단원구 목내동 434-4 · TEL)031-491-6191~2