

의약품 분류번호	322
무기질제제	



일반의약품

헐렘플러스는 유 · 소아 보호를 위한 안전포장 적용 제품입니다. 절취선을 따라 자른 후 모서리 미 접착 화살표 부분을 벗기면 쉽게 약을 꺼낼 수 있습니다.



헐렘플러스는 국내에서 처음으로 소개되는 수산화제이철 폴리말토스복염과 비타민 복합의 철분제제입니다. 헐렘플러스는 철분보급제로 유효성과 안전성을 세계적으로 인정받은 스위스 Vifor사의 폴리말토스 철복염을 주성분으로 하며 기형아 예방에 필수적인 비타민인 폴산, 임신시에 요구량이 증가하는 조혈 관련 비타민인 엽산피리독신을 함유하여 한층 강화된 빈혈치료 작용을 나타냅니다. 또한 철분의 생체 이용율을 높이고 위 자극감을 완화하기 위해 1정당 철분 함유량을 줄여 철분 100mg을 하루에 2번 나누어 복용하도록 하여 민감한 임신부나 여성들에게 특히 효과적입니다.

□ 원료약품의 분량

1정 중	
수산화제이철폴리말토스복염 (KPC)	178.50mg
(철로서 50mg)	
폴산(KP)	0.175mg
엽산피리독신 33 1/3%(별규)	3.03mg
(엽산피리독신으로서 1mg)	

□ 성 상

적갈색의 원형의 정제

□ 효 능 · 효 과

철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

□ 용 법 · 용 량

성인 및 12세 이상 어린이 : 1일 2회, 1회 1정을 식후 30분에 삼키거나 씹어서 복용하십시오.

□ 약 리 작 용

- 우수한 치료 효과와 내약성 : 헐렘플러스의 주성분인 수산화제이철 폴리말토스 복염은 비이온성 철로서 탐식작용(pinocytosis)에 의해 흡수되어 간으로 운반 활용되므로 흡수율이 우수하며 생체 이용율이 높기 때문에 생체가 필요로 하는 철분을 신속히 공급합니다.
- 위장 장애의 극소화 : 헐렘플러스의 주성분이 비이온성 철이므로 위장장애가 거의 나타나지 않으며 분할 복용(하루2번)에 의해 일부 철성분에 민감한 복용자에게서 고농도 철분을 복용할 때 발생하던 위장 장애까지 감소시켰습니다.
- 자유로운 복용 시간 : 치아 착색이나 음식물과 복용시 흡수율이 저하되는 단점이 거의 없어 하루 중 원하시는 시간에 복용할 수 있습니다.
- 임산부의 철분 보급 : 임신, 수유시 부족하기 쉬운 철분이외에도 조산방지, 기형아 예방에 효과가 있어서 임신부에게 적극 권장되는 엽산과 조혈 관련 비타민인 엽산피리독신이 함유되어 있어서 임신부에게 특히 효과적입니다.
- 헐렘플러스는 빈혈에 의한 제반증상을 신속히 소실시키며 1개월 정도의 추가 복용에 의해 근육철(myoglobin)및 저장철의 공급으로 활용됩니다.

□ 사용상의 주의사항

- 경고
철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하십시오. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락하십시오.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 인산염, 칼슘염
 - 경구용테트라사이클린계 제제
 - 제산제
 - 레보도파

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분예의 과민반응 환자
 - 12개월 미만의 영아(갓난아기)
 - 혈색소증(철대사이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시테린침착증 환자
 - 비철결핍성 빈혈 (예 : 비타민 B12 결핍으로 인한 거대적아구성 빈혈) 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차 및 우유 · 유제품은 복용중, 복용전 · 후에는 피하십시오.
- 다음 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
 - 심장 · 순환기계 기능 장애 환자
 - 신장애(신장장애) 환자
 - 저단백혈증 환자
 - 항알도스테론제, 트리암테렌과 함께 복용하는 사람(고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.)
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 상담시 가능한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 두드러기, 가려움, 햇빛 노출시 피부과민 반응
 - 복부 · 위통증, 위 경련, 위부불쾌감
 - 구역, 구토, 설사, 변비, 식욕부진
 - 열, 혼수
 - 피리독신을 1일 50mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병증(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10㎍ 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
 - 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성 심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
 - 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 소아에 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 복용하십시오.
 - 변의 색이 검게 되는 경우가 있으나, 임상적으로 전혀 해가 없습니다.
 - 아스코르빈산(비타민 C) 200mg 이상과 함께 복용하는 경우 철분의 흡수가 증가될 수 있습니다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.
 - 오 · 남용을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

□ 포 장 단 위

자사포장단위

□ 저 장 방 법

기밀용기, 실온보관 (1~30℃)

□ 교환 및 제품문의

이 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 부패 또는 오손된 제품 등은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다. 또한 제품에 대한 문의사항이 있으시면 연락주십시오.

연락처 : 고객보호팀 1588-2675



첨부문서 작성년월일 : 2011. 5. 2 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.jw-pharma.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.



제조판매원

jw **중외제약**
제이더블유중외제약(주)
충남 당진군 송악읍 한진리 416-1

원료공급원(스위스)

Vifor
International